Инструкция по применению
Исмиген Таблетки подъязычные 7 мг 10 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Lallemand
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лиофилизированный лизат бактерий Escherichia coli
Количество в упаковке: 10
Дозировка действующего вещества: 7 мг

Действующее вещество

Лиофилизированный лизат бактерий Escherichia coli

Состав

Лизаты бактерий, в т.ч. staphylococcus aureus, streptococcus pyogenes, streptococcus viridans, streptococcus pneumoniae (типов - ty1/eq11, ty2/eq22, ty3/eq14, ty5/eq15, ty8/eq23, ty47/eq24), klebsiella pneumoniae, klebsiella ozaenae, haemophilus influenzae b, neisseria catarrhalis 7 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Острые и подострые инфекции верхних и нижних дыхательных путей: бронхит, тонзиллит, фарингит, ларингит, ринит, синусит, отит, включая осложнения после гриппа (лечение в составе комбинированной терапии).Рецидивирующие инфекции верхних и нижних дыхательных путей, хронический бронхит (профилактика обострений).

Способ применения и дозы

Под язык; принимать натощак. Таблетку следует держать под языком до полного растворения. Таблетки подъязычные не следует рассасывать, жевать или проглатывать. Острые и подострые инфекции верхних и нижних дыхательных путейПо 1 таблетке в сутки до исчезновения симптомов заболевания (не менее 10 дней).Рецидивирующие инфекции верхних и нижних дыхательных путей, профилактика обострений хронических заболеваний органов дыханияПо 1 таблетке в сутки в течение 10 дней. Профилактический курс включает три цикла по 10 дней с 20-дневными интервалами между ними.Профилактический курс следует проводить не чаще 1–2 раз в год.При пропуске приема очередной дозы не следует ее удваивать при следующем приеме.

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным и/или вспомогательным компонентам препарата, беременность, лактация, детский возраст до 3 лет

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Побочные действия

Частота развития побочных эффектов классифицирована согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: очень часто – более 10%; часто - более 1 и менее 10%; нечасто - более 0.1 и менее 1%; редко - более 0.01 и менее 0.1%; очень редко - менее 0.01%.Со стороны кожных покровов: очень редко - крапивница, импетигинозный дерматит, фолликулит.Прочие: очень редко - воспаление слюнной железы, острый ларингит, ринит.

Передозировка

Сведения о случаях передозировки отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Исмиген может применяться одновременно с другими лекарственными препаратами, предназначенными для лечения острых и хронических респираторных заболеваний. Особенности взаимодействия Исмигена с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не описаны.

Особые указания

Дети в возрасте от 3 до 6 лет во время приема каждый день, до полного растворения таблетки в полости рта, должны находиться под наблюдением взрослых.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНе влияет.