Инструкция по применению
Исмиген Таблетки подъязычные 7 мг 30 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Италия
Производитель: Lallemand
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лизаты бактерий [Haemophilus influenzae b+Klebsiella ozaenae+Klebsiella pneumoniae+Neisseria catarrhalis+Staphylococcus aureus+Streptococcus pneumoniae+Streptococcus pyogenes+Streptococcus viridans]
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 7 мг

Действующее вещество

Лизаты бактерий [Haemophilus influenzae b+Klebsiella ozaenae+Klebsiella pneumoniae+Neisseria catarrhalis+Staphylococcus aureus+Streptococcus pneumoniae+Streptococcus pyogenes+Streptococcus viridans]

Состав

Действующее вещество: Лизаты бактерий: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae (типов - TY1/EQ11, TY2 /EQ22, TY3/EQ14, TY5/EQ15, TY8/EQ23, TY47/EQ24), Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozaenae, Haemophilus influenzae b, Neisseria catarrhalisКонцентрация действующего вещества (мг): 7

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата не предоставлены.

Показания

Острые и подострые инфекции верхних и нижних дыхательных путей: бронхит, тонзиллит, фарингит, ларингит, ринит, синусит, отит, включая осложнения после гриппа (лечение в составе комбинированной терапии).Рецидивирующие инфекции верхних и нижних дыхательных путей, хронический бронхит (профилактика обострений).

Способ применения и дозы

Под язык; принимать натощак. Таблетку следует держать под языком до полного растворения. Таблетки подъязычные не следует рассасывать, жевать или проглатывать

Противопоказания

Гиперчувствительность к активным и/или вспомогательным компонентам препарата, беременность, лактация, детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Побочные действия

Крапивница, импетигинозный дерматит, фолликулит, воспаление слюнной железы, острый ларингит, ринит.

Передозировка

Сведения о случаях передозировки отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Исмиген может применяться одновременно с другими лекарственными препаратами, предназначенными для лечения острых и хронических респираторных заболеваний. Особенности взаимодействия Исмигена с другими лекарственными препаратами до настоящего времени не описаны.

Особые указания

Дети в возрасте от 3 до 6 лет во время приема каждый день, до полного растворения таблетки в полости рта, должны находиться под наблюдением взрослых.Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмамиНе влияет.