Инструкция по применению
Итомед Таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг 40 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Чехия
Производитель: Про.Мед
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Итоприд
Количество в упаковке: 40
Дозировка действующего вещества: 50 мг



Действующее вещество

Итоприд

Состав

Итоприда гидрохлорид 50 мг Вспомогательные вещества: лактоза - 34.975 мг (включая избыток вследствие потери в массе при производстве - 2.93%), крахмал кукурузный - 15 мг, кармеллоза - 20 мг, кислота кремниевая безводная - 4 мг, магния стеарат - 1 мг, гипромеллоза - 4.4 мг, макрогол 6000 - 0.4 мг, титана диоксид - 0.2 мг, воск карнауба - 0.025 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— симптоматическое лечение функциональной неязвенной диспепсии (хронического гастрита): метеоризм, гастралгия, ощущение дискомфорта в эпигастральной области, анорексия, изжога, тошнота, рвота.

Способ применения и дозы

Внутрь, до еды, по 1 таб. 3 раза/сут. Суточная доза препарата составляет 3 таб. (150мг). У пожилых пациентов дозу снижают. Если препарат не был принят вовремя, то в дальнейшем его следует принимать через равные промежутки времени. Не рекомендуется принимать препарат в двойной дозе для компенсации пропущенной.

Противопоказания

— желудочно-кишечные кровотечения . — механическая обструкция и перфорация ЖКТ . — дефицит лактазы . — непереносимость лактозы . — глюкозо-галактозная мальабсорбция . — детский возраст (до 16 лет) . — беременность . — период лактации . — повышенная чувствительность к итоприду или любому вспомогательному компоненту препарата. С осторожностью назначают пациентам, принимающим ингибиторы холинэстеразы и м-холиномиметики . а также пациентам пожилого возраста со сниженной функцией печени и почек.

Применение при беременности и кормлении грудью

Итоприд противопоказан при беременности. При приеме препарата в терапевтических дозах итоприд незначительно проникает в грудное молоко, поэтому следует прекратить прием препарата в период лактации.

Побочные действия

Со стороны органов кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения. Со стороны эндокринной системы: гинекомастия, гиперпролактинемия. Со стороны пищеварительной системы: повышенное слюноотделение, тошнота, диарея, запор, желтуха, боль в эпигастральной области. Со стороны нервной системы: головная боль, нарушение сна,. раздражительность, головокружение, тремор. Аллергические реакции: крапивница, анафилактический шок. Лабораторные показатели: . повышение активности АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, гипербилирубинемия.

Особые указания

Со стороны органов кроветворения: лейкопения, тромбоцитопения. Со стороны эндокринной системы: гинекомастия, гиперпролактинемия. Со стороны пищеварительной системы: повышенное слюноотделение, тошнота, диарея, запор, желтуха, боль в эпигастральной области. Со стороны нервной системы: головная боль, нарушение сна,. раздражительность, головокружение, тремор. Аллергические реакции: крапивница, анафилактический шок. Лабораторные показатели: . повышение активности АСТ, АЛТ, ГГТ, ЩФ, гипербилирубинемия.