Инструкция по применению
Итразол Капсулы 100 мг 42 шт

Характеристики

Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Вертекс
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Итраконазол
Количество в упаковке: 42
Дозировка действующего вещества: 100 мг



Действующее вещество

Итраконазол

Состав

Итраконазол (в форме пеллет) 100 мг Вспомогательные вещества: сахарные пеллеты (сахароза - 80-91.5%, крахмал кукурузный - 8.5-20%) - 207.44 мг, полоксамер 188 (Лутрол) - 25.94 мг, полоксамер 188 (Лутрол) микронизированный - 0.51 мг, гипромеллоза - 130.11 мг. Состав капсул твердых желатиновых: титана диоксид - 2%, желатин - до 100%. Масса капсулы с содержимым - 560 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Показания

Дерматомикозы . грибковый кератит . онихомикозы, вызванные дерматофитами и/или дрожжами и плесневыми грибами . системные микозы: системный аспергиллез и кандидоз, криптококкоз (включая крипто-, кокковый менингит), гистоплазмоз, споротрихоз, паракокцидиоидомикоз, бластомикоз и другие системные или тропические микозы . кандидомикозы с поражением кожи или слизистых, в том числе вульвовагинальный кандидоз . отрубевидный лишай.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к препарату или его составным частям . одновременный прием препаратов, метаболизируется с участием фермента CYP3A4: терфенадин, астемизол, мизоластин, цизаприд, дофетилид, хинидин, пимозид, ингибиторы редуктазы ГМК - КоА, такие как симвастатин и ловастатин, триазолам и мидазолам (см. также раздел «Взаимодействие с другими лекарственными средствами») . детский возраст до 3-х лет . беременность . период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания). Женщинам детородного возраста, принимающим Итразол, необходимо использовать адекватные методы контрацепции на протяжении всего курса лечения вплоть до наступления первой менструации после его завершения.

Побочные действия

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсия, тошнота, боль в животе и запор, обратимое повышение активности печеночных ферментов, холестатическая желтуха, гепатит, анорексия. В очень редких случаях при применении Итразола развивалось тяжелое токсическое поражение печени, в том числе случай острой печеночной недостаточности с летальном исходом . Со стороны центральной нервной системы: головная боль, утомляемость, головокружение, периферическая нейропатия . Со стороны сердечно-сосудистой системы: застойная сердечная недостаточность и отек легких . Со стороны других органов и систем: нарушение менструального цикла, аллергические реакции (такие как зуд, сыпь, крапивница и ангионевротический отек), синдром Стивенса-Джонсона, алопеция, гипокалиемия, отеки, окрашивание мочи в темный цвет, гилеркреатининемия.

Особые указания

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсия, тошнота, боль в животе и запор, обратимое повышение активности печеночных ферментов, холестатическая желтуха, гепатит, анорексия. В очень редких случаях при применении Итразола развивалось тяжелое токсическое поражение печени, в том числе случай острой печеночной недостаточности с летальном исходом . Со стороны центральной нервной системы: головная боль, утомляемость, головокружение, периферическая нейропатия . Со стороны сердечно-сосудистой системы: застойная сердечная недостаточность и отек легких . Со стороны других органов и систем: нарушение менструального цикла, аллергические реакции (такие как зуд, сыпь, крапивница и ангионевротический отек), синдром Стивенса-Джонсона, алопеция, гипокалиемия, отеки, окрашивание мочи в темный цвет, гилеркреатининемия.