Инструкция по применению
Йод 5 % Раствор для наружного применения спиртовой 10 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Йод+[Калия йодид+Этанол]
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5%



Описание

Прозрачная жидкость красно-бурого цвета с характерным запахом.

Действующее вещество

Йод+[Калия йодид+Этанол]

Состав

Активное вещество: йод 50 г,вспомогательные вещества: калия йодид 20 г, этанол 95% , вода очищенная поровну до 1 л.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При контакте с кожей или слизистыми оболочками на 30% превращается в йодиды а остальная часть - в активный йод. Частично всасывается. Абсорбированная часть проникает в ткани и органы селективно поглощается щитовидной железой. Выделяется главным образом почками кишечником потовыми и молочными железами.

Показания

Воспалительные и инфекционные заболевания кожи ссадины порезы микротравмы раны, воспалительные инфильтраты, обработка краев ран кожи перед проведением инъекций пункций катетеризации.

Способ применения и дозы

Наружно смазывают пораженные и подлежащие обработке участки кожи.

Противопоказания

Гиперчувствительность тиреотоксикоз герпетиформный дерматит.

Применение при беременности и кормлении грудью

Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Раздражение кожи при длительном применении на обширных раневых поверхностях - йодизм (ринит крапивница отек Квинке слюнотечение слезотечение угревая сыпь) аллергические реакции (кожный зуд).

Передозировка

При вдыхании паров - поражение верхних дыхательных путей (ожог ларингобронхоспазм), при попадании концентрированных растворов внутрь - тяжелые ожоги пищеварительного тракта развитие гемолиза гемоглобинурии, смертельная доза составляет около 3 г.Лечение: промывают желудок 05% раствором натрия тиосульфата в/в вводится натрия тиосульфат 30% - до 300 мл.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармацевтически несовместим с эфирными маслами растворами аммиака белой осадочной ртутью (образуется взрывчатая смесь).Щелочная или кислая среда присутствие жира гноя крови ослабляет антисептическую активность.

Особые указания

При совместном применении с желтой ртутной мазью возможно образование ртути йодида обладающего прижигающим действием.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не ниже 0 °С.Хранить в недоступном для детей месте.