**Инструкция по применению**
**Йод 5% Раствор спиртовой 10 мл**

### Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Флора Кавказа
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Йод
Количество в упаковке: 1




### Описание

Прозрачная жидкость красно-бурого цвета с характерным запахом.

### Действующее вещество

Йод

### Состав

Действующее вещество: Йод - 50 г Вспомогательные вещества: Калия йодид - 20 г Этанол (спирт этиловый) 95 % - поровну до получения 1000 мл препарата Вода очищенная.

### Форма выпуска

Раствор

### Фармакокинетика

При контакте с кожей на 30 % превращается в йодиды, а остальная часть - в активный йод. Частично всасывается. Абсорбированная часть проникает в ткани и органы, селективно поглощается щитовидной железой. Выводится почками (главным образом), кишечником, потовыми железами, с грудным молоком в период лактации.

**Показания**

Воспалительные и инфекционные заболевания кожи, ссадины, порезы, микротравмы, раны миозит, невралгия, воспалительные инфильтраты обработка краев ран, кожи перед проведением инъекций, пункций, катетеризации.

**Способ применения и дозы**

Наружно. Наносят на пораженные или подлежащие обработке участки кожи.

**Противопоказания**

Гиперчувствительность, тиреотоксикоз, герпетиформный дерматит.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Возможно применение в соответствии с инструкцией. Перед применением препарата, если Вы беременны, или предполагаете, что Вы могли бы быть беременной, или планируете беременность, необходимо проконсультироваться с врачом. Перед применением препарата в период грудного вскармливания необходимо проконсультироваться с врачом.

**Побочные действия**

Раздражение кожи, аллергические реакции (кожный зуд), при длительном применении на обширных раневых поверхностях - йодизм (ринит, крапивница, отек Квинке, повышенное слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь). Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

**Передозировка**

При передозировке возможны явления йодизма, раздражения, ожоги. Лечение симптоматическое, смыть избыток препарата чистой проточной водой.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (ртути амидохлоридом) - образуется взрывчатая смесь.

**Особые указания**

Свет и температура выше 40 °С ускоряют распад активного йода. Препарат должен иметь темно-коричневую окраску. Обесцвечивание раствора свидетельствует о разрушении комплекса с переходом активного йода в йодид-ион и снижении эффективности препарата. Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность. Применение препарата согласно инструкции по медицинскому применению не оказывает отрицательного влияния на выполнение опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций.

**Условия хранения**

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.