Инструкция по применению
Йодантипирин Таблетки 100 мг 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Йодофеназон
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 100 мг



Описание

Йодантипирин - противовирусное средство, применяется при лечении и профилактике клещевого энцефалита. Обладает противовоспалительными, иммуностимулирующими и интерфероногенными свойствами.

Действующее вещество

Йодофеназон

Состав

Йодантипирин, картофельный крахмал, глюкоза, стеарат магния, поливинилпирролидон.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта, биодоступность составляет 80%. До 95% метаболизируется в печени. Экскреция с мочой через почки путем активного транспорта в почечные канальцы: 3-5% в неизменном виде, 80-90% - неактивные метаболиты. Имеет высокое сродство к тканевым белкам. Связывание с белками крови составляет 25%. Период полувыведения - около 6 часов.

Показания

Лечение и профилактика клещевого энцефалита у взрослых, для комплексного лечения геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Способ применения и дозы

Внутрь, после еды. Лечение клещевого энцефалита: по 300 мг. (3 таблетки) - 3 раза в день в течение первых 2-х дней, по 200 мг. (2 таблетки) - 3 раза в день в течение следующих 2-х дней, по 100 мг. (1 таблетка) - 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней. Профилактика: после присасывания клеща - по 300 мг. (3 таблетки) - 3 раза в день в течение первых 2-х дней, по 200 мг. (2 таблетки) - 3 раза в день в течение следующих 2-х дней, по 100 мг. (1 таблетка) - 3 раза в день в течение следующих 5-ти дней, в период пребывания в местах, связанных с возможным присасыванием клещей: по 200 мг. (2 таблетки) 1 раз в день в течение всего периода, по 200 мг. (2 таблетки) 3 раза в день в течение 2-х дней перед посещением мест, связанных с возможным присасыванием клещей. При лечении геморрагической лихорадки с почечным синдромом препарат должен быть назначен в течение пяти дней от начала заболевания (по 200 мг. (2 таблетки) 3 раза в день в течение первых четырех дней, по 100 мг. (1 таблетка) 3 раза в день в течение следующих пяти дней).

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость Йодантипирина и других йодсодержащих препаратов, гиперфункция щитовидной железы, выраженные нарушения функции печени и почек, беременность и период лактации, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано.

Побочные действия

Диспепсические явления, кожная сыпь, зуд, ангионевротический отек.

Взаимодействие с другими препаратами

Антацидные препараты и антагонисты Н2 рецепторов уменьшают всасывание препарата. При совместном приеме с пероральными сахароснижающими препаратами, барбитуратами, трициклическими антидепрессантами, антикоагулянтами непрямого действия Йодантипирин усиливает их действие, вытесняя их из связи с белками.

Особые указания

При лечении и профилактике клещевого энцефалита не рекомендуется совместное применение Йодантипирина и противоклещевого иммуноглобулина. При очаговых формах клещевого энцефалита вначале назначается специфический иммуноглобулин по обычной схеме и через 2-3 дня назначают Йодантипирин в указанных дозировках.