Инструкция по применению
Йодинол Раствор для местного и наружного применения флакон 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Самарамедпром
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Йод+[Калия йодид+Поливиниловый спирт]
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1 мг/мл

Описание

Жидкость темно-синего цвета с характерным запахом, пенящаяся при взбалтывании. Допускаются следы пенообразования на незаполненной части флакона.

Действующее вещество

Йод+[Калия йодид+Поливиниловый спирт]

Состав

ействующие вещества: йод 1 г,вспомогательные вещества: калия йодид 3 г, спирт поливиниловый 9 г, вода очищенная 987 г.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Хронический тонзиллит хронический гнойный отит хронический атрофический ринит (озена) хронический периодонтит гнойные раны трофические и варикозные язвы термические и химические ожоги I и II степени.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям с 6 лет.Местно (промывание смазывание миндалин орошение) наружно наложение марлевых повязок.При хроническом тонзиллите промывают лакуны миндалин и супратонзиллярные пространства. Производят 4-5 промываний с промежутками 2-3 дня. Разовая доза - 50 мл.При хронических гнойных отитах: ежедневное закапывание 5-8 кап при мезотимпанитах и промывание аттика при эпитимпанитах. Курс лечения - 2-4 нед. При лечении хронического атрофического ринита (озены) после предварительного размягчения и удаления корок производится пульверизация препарата в полость носа и глотки путем 2-3 нажатий на насадку распылительную 2-3 раза в неделю в течение 2-3 мес.При лечении хронического периодонтита производят 3-4 раза в день полоскание полости рта по 15-30 с после еды до достижения эффекта.При трофических и варикозных язвах накладывают на поверхность язвы марлевые салфетки (в 3 слоя) смоченные препаратом (предварительно промывают кожу теплой водой с мылом а кожу вокруг язвы смазывают цинковой мазью). Перевязку производят 1-2 раза в сутки при этом марлю лежащую на поверхности язвы не снимают а вновь пропитывают раствором. Через 4-7 дней назначают общую или местную ванну затем вновь продолжают указанное лечение.При гнойных ранах и инфицированных ожогах накладывают рыхлую марлевую повязку пропитанную препаратом.При свежих термических и химических ожогах I-II степени также накладывают марлевую повязку пропитанную раствором внутренний слой повязки орошают препаратом по мере надобности.Применение препарата детьми взрослыми имеющими хронические заболевания: нет сведений. Применение препарата при первом приеме или при его отмене: нет сведений.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата тиреотоксикоз герпетиформный дерматит беременность период лактации перфорация барабанной перепонки детский возраст до 6 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Строго по показаниям врача.

Побочные действия

Аллергические реакции (кожный зуд).При длительном применении явления "йодизма" в виде кожных высыпаний ринита слезотечения гиперсаливации ринореи бронхореи отека слизистых оболочек.

Передозировка

Симптомы при местном и наружном применении: аллергические реакции (кожный зуд) явления йодизма (крапивница ринит слезотечение гиперсаливации ринореи бронхореи отёк Квинке повышенное слюноотделение).Лечение: симптоматическая терапия.Симптомы при случайном применении внутрь: кроме аллергические реакций и явлений йодизма повышенная потливость тахикардия нарушения сна раздражительность диспепсические явления.Лечение: следует вызвать рвоту провести промывание желудка симптоматическая терапия.При возникновении симптомов передозировки а также других симптомов не описанных в инструкции следует срочно обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Несовместим с дезинфицирующими лекарственными средствами содержащими белую осадочную ртуть (образуется взрывчатая смесь) ферменты восстановители щелочи эфирные масла раствор аммиака. Щелочная или кислая среда присутствие жира гноя крови ослабляют антисептическую активность.

Особые указания

Следует избегать попадания в глаза.

Условия хранения

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 0 до 35 °С.Хранить в недоступном для детей месте.