Инструкция по применению
Йодинол Раствор 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Йод+[Калия йодид+Поливиниловый спирт]
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1 мг/мл

Действующее вещество

Йод+[Калия йодид+Поливиниловый спирт]

Состав

Йод 100 мгВспомогательные вещества: калия йодид, поливиниловый спирт.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При контакте с кожей или слизистыми оболочками на 30% превращается в йодиды, а остальная часть - в активный йод. Частично всасывается. Абсорбированная часть проникает в ткани и органы, селективно поглощается щитовидной железой. Выделяется главным образом почками, кишечником, потовыми и молочными железами.

Показания

Для наружного применения: инфекционно-воспалительные поражения кожи, травмы, раны, миалгии.Для местного применения: хронический тонзиллит, атрофический ринит, гнойный отит, трофические и варикозные язвы, раны, инфицированные ожоги, свежие термические и химические ожоги I-II степени.Для приема внутрь: профилактика и лечение атеросклероза, третичный сифилис.

Способ применения и дозы

При наружном применении йодом обрабатывают поврежденные участки кожи.Для приема внутрь дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и возраста пациента.Местно применяют для промывания лакун и супратонзиллярных пространств - 4-5 процедур с интервалами 2-3 дня, для орошения носоглотки - по 2-3 раза в неделю в течение 2-3 мес, для закапывания в ухо и промывания - в течение 2-4 недель; в хирургической практике и при ожогах смачивают по мере надобности наложенные на пораженную поверхность марлевые салфетки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду. Для приема внутрь - туберкулез легких, нефриты, нефрозы, аденомы (в т.ч. щитовидной железы), фурункулез, угревая сыпь, хроническая пиодермия, геморрагические диатезы, крапивница, беременность, детский возраст до 5 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан для приема внутрь при беременности.

Побочные действия

При наружном применении: редко - раздражение кожи; при длительном применении на обширных раневых поверхностях - йодизм (ринит, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь).При приеме внутрь: кожные аллергические реакции, тахикардия, нервозность, нарушения сна, повышенная потливость, диарея (у пациентов старше 40 лет).

Взаимодействие с другими препаратами

Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (образуется взрывчатая смесь). Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность. Ослабляет гипотиреоидное и струмогенное влияние препаратов лития.

Особые указания

При длительном применении возможны явления йодизма.