Инструкция по применению
Йодопирон раствор для наружного 1% 100мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Повидон-Йод+Калия йодид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%

Действующее вещество

Повидон-Йод+Калия йодид

Состав

1000 мл йод 14.1 г. Вспомогательные вещества: калия йодид 13.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Для наружного применения: инфекционно-воспалительные поражения кожи, травмы, раны, миалгии. Для местного применения: хронический тонзиллит, атрофический ринит, гнойный отит, трофические и варикозные язвы, раны, инфицированные ожоги, свежие термические и химические ожоги I-II степени. Для приема внутрь: профилактика и лечение атеросклероза, третичный сифилис.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду. Для приема внутрь - туберкулез легких, нефриты, нефрозы, аденомы (в т.ч. щитовидной железы), фурункулез, угревая сыпь, хроническая пиодермия, геморрагические диатезы, крапивница, беременность, детский возраст до 5 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан для приема внутрь при беременности.

Побочные действия

При наружном применении: редко - раздражение кожи . при длительном применении на обширных раневых поверхностях - йодизм (ринит, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь). При приеме внутрь: кожные аллергические реакции, тахикардия, нервозность, нарушения сна, повышенная потливость, диарея (у пациентов старше 40 лет).

Особые указания

При наружном применении: редко - раздражение кожи . при длительном применении на обширных раневых поверхностях - йодизм (ринит, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь). При приеме внутрь: кожные аллергические реакции, тахикардия, нервозность, нарушения сна, повышенная потливость, диарея (у пациентов старше 40 лет).