# Инструкция по применению
# Йодопирон Раствор для наружного применения 1 % 250 мл

## Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Повидон-Йод+Калия йодид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%




## Описание

Антисептик для наружного применения.

## Действующее вещество

Повидон-Йод+Калия йодид

## Состав

Йод 14.1 г. Вспомогательные вещества: калия йодид 13.8 г, повидон низкомолекулярный 122.1 г, вода очищенная до 1000 мл.

## Форма выпуска

Раствор

## Фармакокинетика

При контакте с кожей или слизистыми оболочками на 30% превращается в йодиды, а остальная часть - в активный йод. Частично всасывается. Абсорбированная часть проникает в ткани и органы, селективно поглощается щитовидной железой. Выделяется главным образом почками, кишечником, потовыми и молочными железами.

**Показания**

Для наружного применения: инфекционно-воспалительные поражения кожи, травмы, раны, миалгии. Для местного применения: хронический тонзиллит, атрофический ринит, гнойный отит, трофические и варикозные язвы, раны, инфицированные ожоги, свежие термические и химические ожоги I-II степени. Для приема внутрь: профилактика и лечение атеросклероза, третичный сифилис.

**Способ применения и дозы**

При наружном применении йодом обрабатывают поврежденные участки кожи. Для приема внутрь дозу устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний и возраста пациента. Местно применяют для промывания лакун и супратонзиллярных пространств - 4-5 процедур с интервалами 2-3 дня, для орошения носоглотки - по 2-3 раза в неделю в течение 2-3 мес, для закапывания в ухо и промывания - в течение 2-4 недель, в хирургической практике и при ожогах смачивают по мере надобности наложенные на пораженную поверхность марлевые салфетки.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к йоду. Для приема внутрь: туберкулез легких, нефриты, нефрозы, аденомы (в т.ч. щитовидной железы), фурункулез, угревая сыпь, хроническая пиодермия, геморрагические диатезы, крапивница, беременность, детский возраст до 5 лет.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказан для приема внутрь при беременности.

**Побочные действия**

При наружном применении: редко: раздражение кожи, при длительном применении на обширных раневых поверхностях - йодизм (ринит, крапивница, отек Квинке, слюнотечение, слезотечение, угревая сыпь). При приеме внутрь: кожные аллергические реакции, тахикардия, нервозность, нарушения сна, повышенная потливость, диарея (у пациентов старше 40 лет).

**Взаимодействие с другими препаратами**

Фармацевтически несовместим с эфирными маслами, растворами аммиака, белой осадочной ртутью (образуется взрывчатая смесь). Щелочная или кислая среда, присутствие жира, гноя, крови ослабляют антисептическую активность. Ослабляет гипотиреоидное и струмогенное влияние препаратов лития.

**Особые указания**

При длительном применении возможны явления йодизма.

**Условия хранения**

Беречь от детей. При комнатной температуре.