Инструкция по применению
Йодопирон Раствор для наружного применения 1 % 450 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: Южфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Повидон-Йод+Калия йодид
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%

Описание

Пленкообразующая темно-коричневая жидкость без запаха или со слабым специфическим запахом.

Действующее вещество

Повидон-Йод+Калия йодид

Состав

В 1000 мл раствора содержит: активные вещества: йод 99,5% - 14,10 г, вспомогательные вещества: калия йодид 99,5% - 13,80 г, повидон К-17 - 122,10 г, вода очищенная до 1000 мл.

Форма выпуска

Раствор

Показания

Обеззараживание рук хирурга операционного поля хирургических перчаток и локтевых сгибов доноров ожоги гнойные и инфицированные раны остеомиелит.

Способ применения и дозы

Наружно. 01-05% водные растворы готовят из 1% раствора непосредственно перед применением. В качестве антисептика для обработки рук хирурга применяют 01% (по активному йоду) растворы (5 мл) операционное поле протирают салфеткой смоченной в растворе. При обширных ожогах больного погружают в ванну с раствором 1:32 или 1:50 на 10-15 минут. Для комплексного лечения гнойных и инфицированных ран остеомиелита обеззараживания хирургических перчаток и обработки локтевых сгибов доноров - 05% и 1% (по активному йоду) растворы Йодопирона.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата гипертиреоз герпетиформный дерматит Дюринга аденома щитовидной железы почечная недостаточность перед терапией радиоактивным йодом, период новорожденности (особенно у недоношенных детей).

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания (при необходимости применение возможно под индивидуальным медицинским контролем).

Побочные действия

Сухость кожи аллергические реакции (кожный зуд гиперемия на местах аппликации крапивница). При нанесении на обширную раневую поверхность возможно быстропроходящее жжение.

Передозировка

Симптомы передозировки: раздражение в месте нанесения. Лечение: симптоматическое. Длительное применение (более 7-10 дней) может вызвать явление йодизма ("металлический" привкус во рту повышенное слюнотечение отеки глаз или гортани и т.д.) при появлении которого следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. При случайном проглатывании йода возможно поражение слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Следует промыть желудок 05% раствором натрия тиосульфата в качестве антидота перорально используется активированный уголь крахмальный клейстер мучной отвар слизистое питье молоко и /или внутривенно каждые 4 часа 10 мл 10% раствор натрия тиосульфата а также симптоматическая терапия.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармацевтически несовместим с дезинфицирующими средствами содержащими ртуть окислителями солями щелочей и веществами с кислой реакцией с лекарственными средствами для наружного применения содержащими ферменты (йод снижает активность ферментов). В присутствии крови бактерицидное действие может уменьшиться. При одновременном применении с препаратами лития возможен синергетический гипотиреоидный эффект.

Особые указания

Избегать попадания раствора в глаза. Не нагревать перед применением. Не использовать при укусах насекомых домашних и диких животных. Во время применения индикаторные бумаги для обнаружения скрытого кровотечения в стуле и моче могут показать ложноположительные результаты вследствие сильного окислительного действия повидон-йода. Окраска на коже и тканях легко смывается водой. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на управление транспортными средствами и занятие другими потенциально опасными видами деятельности требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.