Инструкция по применению
Йодовидон спрей 0,5% 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Повидон-йод
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 0.5%
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Повидон-йод

Состав

1 баллон:Повидон-йод 1.38 гВспомогательные вещества: левоментол 0.3 г, этанол 95% 6 г, пропиленгликоль 9 г, натрия фосфата додекагидрат для регулирования pH, вода очищенная до получения 30 г препарата.

Форма выпуска

Спрей

Показания

Для обработки кожи пациента до и после проведения операций, исследований (биопсия, пункция, взятие крови, инъекции и т.д.), до- и послеоперационной обработки рук хирургов, медицинского персонала, гигиеническая обработка рук при уходе за инфицированными больными, обработка инструмента и предметов ухода за больными.Для местного применения: инфекции носоглотки, лечение инфицированных поражений кожи (ожоги, раны, язвы, ссадины), профилактика инфицирования раневых поверхностей, лечение неспецифических вагинитов, трихомониаз.

Способ применения и дозы

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

Противопоказания

Гипертиреоз, аденома щитовидной железы, почечная недостаточность, беременность, период лактации (грудное вскармливание), повышенная чувствительность к йоду. Нельзя использовать для обработки кожных покровов у недоношенных и новорожденных детей.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан при беременности, в период лактации.

Побочные действия

Возможно местное проявление повышенной чувствительности к йоду (зуд, гиперемия), что требует отмены лечения.

Взаимодействие с другими препаратами

Фармацевтически несовместим с дезинфицирующими средствами, содержащими ртуть; окислителями, солями щелочей и веществами с кислой реакцией.

Особые указания

Раствор повидона-йода не применять в комплексе с другими антисептическими средствами, энзиматическими мазями. Перед систематическим применением препаратов повидона-йода целесообразно пробное использование. В присутствии крови бактерицидное действие повидона-йода может уменьшиться. Следует избегать попадания препаратов повидона-йода в глаза.

Условия хранения

Беречь от детей