Инструкция по применению
Йокс-Тева Спрей для местного применения 30 мл

Характеристики



Форма выпуска: Спрей
Страна: Чехия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аллантоин+Повидон-Йод
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2,55 г+ 0,03 г /30 мл

Действующее вещество

Аллантоин+Повидон-Йод

Состав

на 1 флакон: Действующие вещества: повидон-йод 2,550 г, аллантоин 0,030 г. Вспомогательные вещества: левоментол 0,300 г, кислоты лимонной моногидрат 0,060 г, натрия цитрата дигидрат 0,060 г, этанол 96 % 6,00 г, пропиленгликоль 9,00 г, вода очищенная до 30,00 мл.

Форма выпуска

Спрей

Показания

1\. Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки, в том числе: ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты. 2\. Для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде. 3\. Для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии. 4\. При стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

Способ применения и дозы

Местно. Инструкция для пациентов по использованию аппликаторов: Дозированное распределение препарата из флакона осуществляется с помощью механического распылителя и аппликатора (см. рис. А1 или А2) 1\. Если аппликатор помещен в полиэтиленовый пакет, извлеките его из пакета с помощью ножниц или аналогичного инструмента (см. рис. В2). 2\. Проверьте целостность аппликатора. При повреждении аппликатора, его использование запрещено. 3\. Снимите защитную крышку с механического распылителя. 4\. Установите аппликатор на флакон (см. рис. В3). 5\. Нажмите 2-3 раза, чтобы раствор прошел через распылитель, после чего начнется распыление препарата. 6\. Поместите трубку аппликатора на 2 - 3 см в полость рта, задержите дыхание и нажмите на аппликатор 2 раза, при этом при первом нажатии распыляйте препарат в правую сторону, а при втором - в левую. При распылении удерживайте флакон в вертикальном положении. Перед использованием промывайте аппликаторы горячей водой и всегда проверяйте их целостность. Запрещается пользоваться поврежденным аппликатором. Использовать препарат Йокс®-Тева спрей рекомендуется 2 - 4 раза в день. В случае необходимости препарат можно применять чаще - через каждые 4 часа.

Противопоказания

– Повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата – беременность и период кормления грудью – дети до 8 лет – нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз) – сердечная недостаточность – герпетиформный дерматит Дюринга – одновременное применение радиоактивного йода.

Побочные действия

Препарат Йокс®-Тева спрей обычно переносится хорошо. В отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности к препарату и проявление аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что требует отмены препарата. Длительное применение препарата может вызвать явление йодизма (в том числе: металлический вкус, повышенное слюнотечение, отеки глаз или гортани), при появлении которого следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не рекомендуется одновременное применение препарата Йокс®-Тева с другими антисептическими средствами, предназначенными для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащими перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

Особые указания

Не применять внутрь. Не следует вдыхать или проглатывать препарат.

Условия хранения

В сухом месте