Инструкция по применению
Йокс-Тева Раствор для местного применения 50 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Чехия
Производитель: ТЕВА
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Аллантоин+Повидон-Йод
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 8,5 г+ 100 мг /100 мл
Срок годности: 60

Действующее вещество

Аллантоин+Повидон-Йод

Состав

На 1 флакон: Действующие вещества (50 мл / 100 мл): повидон-йод 4,250 г / 8,500 г, аллантоин 0,050 г / 0,100 г. Вспомогательные вещества (50 мл / 100 мл): левоментол 0,500 / 1,000 г, лимонной кислоты моногидрат 0,100 / 0,200 г, натрия цитрата дигидрат 0,100 / 0,200 г, этанол 96 % 10,000 / 20,000 г, пропиленгликоль 15,000 / 30,000 г, вода очищенная - до 50,000 / 100,000 мл.

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

При местном применении повидон-йода на неповрежденную кожу абсорбция йода минимальна. При вагинальном применении, применении в полости рта или на поврежденной коже (тяжелые ожоги) системная абсорбция более выражена, и следствием может стать нарушение функции щитовидной железы. Йод в организме превращается в йодиды, накапливающиеся преимущественно в щитовидной железе. Йодиды, не захваченные щитовидной железой, выводятся в основном почками, в небольшом количестве - со стулом, слюной и потом. Они проходят через плаценту и проникают в материнское молоко.

Показания

1. Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки: в том числе ангины, тонзиллиты, тонзилофарингиты, глосситы, стоматиты, афты. 2. Для обработки полости рта и глотки при хирургических вмешательствах на дыхательных путях и полости рта и в послеоперационном периоде. 3. Для лечения инфекций полости рта и горла, возникающих при химиотерапии. 4. При стрептококковых ангинах применяется как дополнительное средство при лечении антибиотиками.

Способ применения и дозы

Местно. Раствор препарата разбавить питьевой водой с температурой около 18 ° С в соотношении 1:20-1:40 (т.е. от 2,5 мл до 5 мл с помощью вложенного в упаковку мерного колпачка или ½ - 1 чайную ложку в 100 мл воды). Разведенным раствором полоскать полость рта или глотки. Использовать препарат Йокс®-Тева раствор рекомендуется 2-4 раза в день, в случае необходимости препарат можно применять и более часто до 6-ти раз в сутки. Минимальные интервалы между полосканиями - 4 часа. Осветление раствора указывает на снижение его противомикробной эффективности. Распад ускоряется на свету, а также при температуре выше 40 °С. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к йоду и другим компонентам препарата - беременность и период кормления грудью - дети до 6 лет - нарушение функции щитовидной железы (гипертиреоз) - нарушение функции почек - сердечная недостаточность - герпетиформный дерматит Дюринга - за две недели до и после планируемого обследования или лечения радиоактивным йодом.

Применение при беременности и кормлении грудью

Беременность В рамках доклинических исследований было обнаружено мутагенное и модифицирующее ДНК воздействие повидон-йода. В опытах на Salmonella typhimurium отмечалось специфическое изменение структуры ДНК живых клеток. При оценке эмбриотоксического воздействия на американских морских ежах были выявлены аномалии развития эмбрионов. Нет данных о местном применении повидон-йода в полости рта и глотки у беременных женщин. При вагинальном применении или при местной аппликации на кожу в период беременности или во время родов у новорожденных обнаруживался врожденный гипотиреоз либо зоб. По этой причине данный препарат во время беременности противопоказан. Период грудного вскармливания Йод проникает в материнское молоко. В крови и моче младенцев была обнаружена концентрация йода, многократно превышающая концентрацию йода у матерей, принимающих повидон-йод. Высокая концентрация в сыворотке крови может стать причиной сниженной функции щитовидной железы у новорожденных. Поэтому данный препарат нельзя применять в период лактации.

Побочные действия

Препарат Йокс®-Тева раствор обычно переносится хорошо. Описанные побочные эффекты классифицируют в соответствии с системами организма и частотой проявлений: Частота проявлений определяется как: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, но < 1/10), нечасто (≥ 1/1000, но < 1/100), редко (≥ 1/10000, но < 1/1000), очень редко (< 1/10000), неизвестно (нет возможности определить частоту побочного эффекта, исходя из доступных данных). Нарушения со стороны иммунной системы: Очень редко: анафилактический шок Расстройства желудочно-кишечного тракта: Нечасто: ощущение сухости во рту Нарушения в области кожного покрова и подкожных тканей: Редко: крапивница Очень редко: ангионевротический отек Общие нарушения и реакции в месте применения: Нечасто: жжение в месте аппликации (преимущественно у детей) Травмы, отравления и иные сложности: Йодизм (металлический привкус во рту, повышенное слюноотделение, отеки глаз и горла, отек легких, высыпания, расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта). В отдельных случаях возможны реакции повышенной чувствительности к препарату и проявление аллергической реакции на йод (зуд, гиперемия), что требует отмены препарата. Длительное применение препарата может вызвать явление йодизма (в том числе: металлический вкус, повышенное слюнотечение, отеки глаз или гортани), при появлении которого следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Данные о передозировке отсутствуют при правильном местном применении в полости рта или глотки. При проглатывании раствора йода происходит острое отравление из-за коррозийного и разъедающего действия йода. Вначале пациенты отмечали металлический привкус во рту, рвоту, боли в желудке и понос. Через 1-3 дня появлялась анурия, отек голосовой щели, ведущий к асфиксии, аспирационная пневмония или отек легких. В некоторых случаях происходила остановка кровообращения. Лечение передозировки Лечение исключительно симптоматическое. Сначала проводят стандартные меры по ограничению дальнейшего всасывания из желудочно-кишечного тракта. Пострадавшему дают молоко и крахмальную слизь. Если не поврежден пищевод, можно сделать промывание желудка. Далее следует принять активированный уголь и 1% или 5% раствор тиосульфата натрия, который преобразует йод в йодид. Выведение абсорбированного вещества можно ускорить осмотическим диурезом. Опыт применения диализа в литературе не описан. Специфического антидота не существует.

Взаимодействие с другими препаратами

Нецелесообразно одновременное применение препарата Йокс; с другими антисептическими средствами для местного применения в полости рта и глотки, особенно содержащие перекись водорода, в связи с инактивацией препарата.

Особые указания

Не применять внутрь! Не следует вдыхать или проглатывать препарат! При ларингите препарат можно применять только в случае крайней необходимости. Препарат необходимо применять с осторожностью пациентам с нарушением функции печени. У пациентов с нарушением функции печени может произойти повышение уровня трансаминаз, поэтому необходимо контролировать их уровень в сыворотке крови. Препарат содержит около 19 % этанола. Препарат содержит 1500 мг пропиленгликоля в одной дозе (5 мл), что соответствует 9000 мг пропиленгликоля в максимальной суточной дозе (30 мл), что может вызывать раздражение слизистых оболочек.

Условия хранения

В сухом месте