Инструкция по применению
Юниэнзим с МПС Таблетки покрытые оболочкой 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Трансатлантик
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Грибковая диастаза+Симети кон+Папаин+Никотинамид+Активированный уголь
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 20 мг+30 мг+50 мг+75 мг+25 мг
Срок годности: 24

Описание

Таблетки, покрытые оболочкой Юниэнзим с МПС - пищеварительный ферментный препарат с компонентом, уменьшающим метеоризм.

Действующее вещество

Грибковая диастаза+Симетикон+Папаин+Никотинамид+Активированный уголь

Состав

Грибковая диастаза 20 мг, папаин 30 мг, симетикон 50 мг, активированный уголь 75 мг, никотинамид 25 мг.Вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, лактоза, акации порошок, кальция гидрофосфат, желатин, тальк, магния стеарат, натрия кармеллоза, шеллак, сахароза, титана диоксид, касторовое масло, кальция карбонат, уголь древесный, натрия бензоат, воск, воск карнаубский.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Терапевтический эффект препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение фармакокинетических исследований не представляется возможным.

Показания

Патологические состояния, сопровождающиеся нарушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы: хронический панкреатит, панкреатэктомия, состояние после облучения (в составе комплексной терапии), метеоризм, в т.ч. в послеоперационном периоде, диспепсия, обусловленная непривычной пищей или перееданием.

Способ применения и дозы

Внутрь по 1 таблетке 1-2 раза в сутки после приема пищи.

Противопоказания

—острый панкреатит —острые заболевания ЖКТ —повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

С осторожностью следует назначать препарат при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции, покраснение кожи (особенно лица и шеи).

Передозировка

Сведения о передозировке препарата Юниэнзим с МПС отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействие с другими препаратами препарата Юниэнзим с МПС не описано.

Особые указания

Пациент должен быть информирован, что в случае ухудшения самочувствия или появления побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Условия хранения

В сухом месте