Инструкция по применению
Юнона Набор гинекологический стерильный одноразовый тип-4

Характеристики

Форма выпуска: Набор
Страна: Беларусь
Производитель: Медицинское предприятие Симург
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Медицинское изделие Наборы гинекологические «Юнона» (ТУ РБ 300046934.010-2002) (далее наборы), однократного применения, предназначенные для гинекологических осмотров при исследованиях, операциях и других манипуляциях. Область применения - акушерство и гинекология. Наборы используются в специализированных медучреждениях врачом специалистом.Набор предназначен для проведения гинекологического осмотра и осмотра слизистой влагалища и шейки матки в зеркалах. Входящая в состав набора ложка Фолькмана предназначена для забора материала с поверхности слизистой влагалища, из цервикального канала и уретры для бактериологических исследований.

Состав

В комплект входят: подкладная пелёнка, две смотровые перчатки среднего размера (М), зеркало гинекологическое по Куско и цитощётка.

Форма выпуска

Набор

Способ применения и дозы

Методикаприменения Акушерско-гинекологический осмотр с использованием Наборов гинекологических «Юнона» должен выполняется с соблюдением общепринятых правил асептики.Рекомендуемый порядок применения.1. Вскрыть стерилизационную (конечную) упаковку набора и извлечь подкладную пеленку и бахилы (для наборов в исполнении «+»).2. Передать пациентке бахилы (для наборов в исполнении «+»).3. Подкладную пеленку поместить на гинекологическое кресло, затем надеть перчатки.4. Применять инструменты, входящие в состав наборов, в соответствии с руководством по эксплуатации конкретного инструмента.5. Использованные инструменты, подкладные пеленки, бахилы и перчатки после дезинфекции подлежат утилизации.

Побочные действия

Примите к сведению, что при ношении контактных линз могут возникнуть следующие проблемы: снижение ощущения комфорта при последующем ношении линз жжение в глазах, зуд и / или острая боль ощущение наличия инородного тепа в процессе ношения линз / царапины в глазу временное нарушение зрения вследствие наличия периферических инфильтратов, периферической язвы роговицы и эрозии роговицы физиологические отклонения, такие как местный или генерализованный отёк, неоваскуляризация роговицы, окрашивание роговицы, инъекция сосудов, патологии хряща век, ирит или конъюнктивит. Некоторые из них клинически приемлемы в незначительных проявлениях чрезмерная слезоточивость, необычные выделения или покраснения глаз нарушение режима ношения линз или ношение в течение длительного времени может привести к снижению остроты зрения, затуманиванию зрения, появлению радужных кругов вокруг объектов, светобоязни или сухости глаз. Возникновение перечисленных выше симптомов может быть вызвано серьёзным заболеванием, например, инфекцией, язвой роговицы, неоваскуляризацией или притом. Нужно немедленно обратиться к специалисту по коррекции зрения для определения проблемы и лечения во избежание серьёзных поражений глаз.Минимум один раз в день необходимо проведение 3-этапной самопроверки.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C.