Инструкция по применению
Каберголин Таблетки 0,5 мг 8 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Каберголин
Количество в упаковке: 8



Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого или почти белого цвета с риской с одной стороны и с фаской с обеих сторон. Таблетку можно разделить на равные дозы.

Действующее вещество

Каберголин

Состав

Препарат Каберголин содержит Действующим веществом является каберголин. Каждая таблетка содержит 0,5 мг каберголина. Вспомогательными веществами являются: лактоза безводная, лейцин, магния стеарат. Препарат Каберголин содержит лактозу (см. раздел 2).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Лекарственный препарат Каберголин показан к применению у взрослых и подростков в возрасте старше 16 лет. Предотвращение физиологической лактации (выделение молока молочной железой) после родов. Подавление уже установившейся послеродовой лактации. Лечение нарушений, связанных с гиперпролактинемией (повышенным содержанием пролактина в крови), включая аменорею (отсутствие менструаций в течение 6 месяцев и больше), олигоменорею (редкие менструации, но с интервалом не реже 60-90 дней), ановуляцию (отсутствие овуляции у женщины репродуктивного возраста), галакторею (самопроизвольное истечение молока из молочных желез вне связи с кормлением ребенка). Пролактинсекретирующие аденомы гипофиза (микро- и макропролактиномы), идиопатическая гиперпролактинемия, синдром «пустого турецкого седла» в сочетании с гиперпролактинемией.

Способ применения и дозы

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом. Рекомендуемая доза Предотвращение лактации 1 мг однократно (2 таблетки по 0,5 мг), в первый день после родов (предпочтительно с первым приемом пищи после родов). Подавление установившейся лактации По 0,25 мг (1/2 таблетки) 2 раза в сутки через каждые 12 часов в течение двух дней (общая доза равна 1 мг). С целью снижения риска ортостатической артериальной гипотензии у женщины однократная доза каберголина не должна превышать 0,25 мг. Лечение нарушений, связанных с гиперпролактинемией Рекомендуемая начальная доза - 0,5 мг в неделю в один (1 таблетка 0,5 мг) или два приема (по 1/2 таблетки 0,5 мг), например, в понедельник и четверг. Дозировка повышается постепенно, обычно на 0,5 мг с интервалом в 1 месяц до достижения оптимального терапевтического эффекта. Терапевтическая доза обычно составляет 1 мг в неделю, но может колебаться от 0,25 до 2 мг в неделю. Максимальная доза для пациенток с гиперпролактинемией не должна превышать 4,5 мг в неделю. В зависимости от переносимости препарата недельную дозу можно принимать однократно или разделить на 2 и более приемов в неделю. Разделение недельной дозы на несколько приемов рекомендуется при назначении препарата в дозе более 1 мг в неделю. Путь и/или способ введения Таблетки принимают внутрь, во время еды. Пациенты пожилого возраста Учитывая показания к применению, опыт применения каберголина у пациентов пожилого возраста ограничен. Имеющиеся данные не указывают на наличие особого риска. Пациенты с нарушениями функции печени У пациентов с печеночной недостаточностью тяжелой степени следует применять более низкие дозы каберголина.

Противопоказания

Не принимайте препарат Каберголин: если у Вас аллергия на каберголин или другие алкалоиды спорыньи, или на любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша, если у Вас фиброзные изменения (образование рубцовой ткани) в легких, перикарде или забрюшинном пространстве в анамнезе, если у Вас имеются анатомические признаки патологии клапанного аппарата сердца (такие как, утолщение створки клапана, сужение просвета клапана, наличие смешанной патологии клапана, стеноз клапанов), подтвержденные эхокардиографическим исследованием (ЭхоКГ) до начала терапии, если у Вас непереносимость лактозы, дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (состояние, при котором клетки кишечника не могут усваивать сахара - глюкозу и галактозу), если Вам меньше 16 лет, если Вы беременны или кормите ребенка грудью.

Применение при беременности и кормлении грудью

Важные предостережения перед применением Каберголина Противопоказания и осторожность при: Артериальной гипертензии Тяжелых сердечно-сосудистых заболеваниях Синдроме Рейно Язвенной болезни и желудочно-кишечных кровотечениях Тяжелой печеночной недостаточности Психотических нарушениях Приеме гипотензивных препаратов Необходимые обследования: Обследование гипофиза Эхокардиограмма Рентгенография грудной клетки Оценка функции легких и почек Анализ на маркеры воспаления Тревожные симптомы (требуют срочной консультации врача): Одышка, затрудненное дыхание Непроходящий кашель Боль в груди Боли в боку или пояснице Отеки нижних конечностей Симптомы сердечной недостаточности Мониторинг лечения: Первая ЭхоКГ через 3-6 месяцев Повторные исследования каждые 6-12 месяцев Особые указания для женщин: Исключение беременности до начала лечения Регулярные тесты на беременность Барьерная контрацепция во время лечения Наблюдение при беременности для контроля размеров гипофиза Побочные эффекты: Сонливость Внезапное засыпание (у пациентов с болезнью Паркинсона) Расстройства поведения (игромания, гиперсексуальность) Ограничения: Не рекомендуется при нарушении функции почек Противопоказан детям до 16 лет Запрещен при грудном вскармливании При беременности: Прекратить прием после подтверждения беременности При появлении любых побочных эффектов:необходимо немедленно сообщить врачу для коррекции терапии.

Побочные действия

Важные предупреждения Немедленно прекратите прием препарата и обратитесь к врачу при: Признаках поражения клапанов сердца: затрудненное дыхание одышка учащенное сердцебиение боль в груди, спине или области таза отеки ног Тяжелых аллергических реакциях: кожная сыпь отек лица, губ, языка затрудненное дыхание Основные побочные эффекты Очень частые (более 10%): Головная боль и головокружение Тошнота и расстройства пищеварения Астения (слабость, утомляемость) Поражения клапанов сердца Частые (до 10%): Депрессия и сонливость Снижение артериального давления Запор и рвота Дискомфорт в молочных железах Нечастые (до 1%): Повышение либидо Обмороки Парестезии Легочный фиброз Отеки Редкие и очень редкие реакции: Нарушения зрения Психотические расстройства Агрессивное поведение Дыхательная недостаточность При любых побочных эффектах: необходимо сообщить о них врачу для оценки необходимости коррекции терапии. Особые указания: При длительном применении возможно снижение артериального давления Возможны нарушения контроля импульсов (игромания, компульсивные покупки)

Передозировка

Если Вы приняли препарата Каберголин больше, чем следовало Если Вы приняли препарата Каберголин больше, чем следовало у Вас могут возникнуть следующие симптомы: тошнота, рвота, диспептические расстройства, потеря сознания при переходе из положения «лежа» в положение «стоя» (ортостатическая артериальная гипотензия), спутанность сознания, психоз, галлюцинации. При передозировке следует провести вспомогательные мероприятия, направленные на выведение невсосавшегося препарата (промывание желудка) и, при необходимости, поддержание артериального давления. Следует незамедлительно обратиться к Вашему лечащему врачу. Если Вы забыли принять препарат Каберголин Если Вы забыли принять дозу препарата Каберголин, сделайте это как только вспомните, если еще не подходит время приема следующей дозы. В этом случае продолжите прием препарата согласно предписанию. Не принимайте двойную дозу препарата для восполнения пропущенной дозы. Если Вы прекратили прием препарата Каберголин При прекращении использования каберголина возможно ухудшение симптомов Вашего заболевания. Перед прекращением терапии Вам следует проконсультироваться с врачом. Каберголин выводится из кровотока в течение многих дней, при этом эффект лечения может ухудшиться в течение 2-недельного периода, что приведет к усилению лактации. При наличии вопросов по применению препарата, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Взаимодействие с другими препаратами

Сообщите лечащему врачу о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие лекарственные препараты. Каберголин не следует применять в комбинации с антагонистами дофаминовых рецепторов (фенотиазины, бутирофеноны, тиоксантены, метоклопрамид, домперидон, ализаприд и др.), т.к. они могут ослабить действие каберголина, направленное на снижение концентрации пролактина. Не рекомендуется длительное применение каберголина с другими алкалоидами спорыньи. Как и другие производные спорыньи, каберголин нельзя применять одновременно с антибиотиками класса макролидов (например, эритромицином, джозамицином, тролеандомицином), т.к. это может привести к увеличению содержания каберголина в крови. Препарат Каберголин с пищей Препарат Каберголин применяется во время еды.

Особые указания

Препарат Каберголин содержит лактозу Если у Вас непереносимость некоторых сахаров, обратитесь к лечащему врачу перед приемом данного лекарственного препарата. Пациенты, принимающие каберголин, должны воздержаться от управления транспортными средствами и механизмами и другой потенциально опасной деятельности, требующей повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Хранить при температуре не выше 25 °С в картонной упаковке (пачке).