Инструкция по применению
Каланхоэ сок 20 мл

Характеристики



Форма выпуска: Жидкость
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Каланхоэ побегов сок
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24

Действующее вещество

Каланхоэ побегов сок

Состав

1000 мл раствора для местного и наружного применения содержит: действующее вещество: каланхоэ побеги свежие- достаточное количество для получения сока 760 мл, вспомогательное вещество: этилового спирта 95 %- до 1000 мл

Форма выпуска

Жидкость

Показания

Трофические язвы, незаживающие раны, ожоги, пролежни, трещины сосков у кормящих матерей, различные воспалительные заболевания полости рта и пародонта (афтозный стоматит, гингивит, пародонтит).

Способ применения и дозы

Наружно. Рану или язву орошают препаратом (1-3 мл) и накладывают марлевую повязку (4-5 слоев), обильно смоченную препаратом. Повязку меняют вначале ежедневно, затем через день. Один раз в день дополнительно смачивают нижние слои повязки препаратом (сняв верхние слои). Средняя продолжительность лечения 15-20 дней. При трещинах сосков после каждого кормления на соски наносят пипеткой несколько капель препарата. Длительность лечения составляет 4-5 дней. В стоматологии препарат применяют местно в виде аппликаций ежедневно на слизистую оболочку полости рта 3-4 раза в день; длительность аппликации составляет 15-20 минут. Курс лечения - 1-2 недели.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата Каланхоэ сок.

Побочные действия

Аллергические реакции. В редких случаях - ощущение жжения в ране.

Особые указания

В случае появления в ране ощущения жжения добавляют 2 мл 2 % раствора новокаина на 100 мл препарата. Перед употреблением препарат следует выдерживать при комнатной температуре не менее 30 минут. В стоматологической практике препарат перед применением подогревают на водяной бане до температуры +37 °C.

Условия хранения

В защищенном от света и недоступном для детей месте при температуре от +18 до +20 °C.