Инструкция по применению
Кальцекс Таблетки 500 мг 10 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Татхимфармпрепараты
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Метенамина кальция хлорид
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 48.0



Действующее вещество

Метенамина кальция хлорид

Состав

Метенамина кальция хлорид 500 мг

Форма выпуска

Таблетки

Показания

— симптоматическое лечение острых респираторных заболеваний и «простудных» заболеваний (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Препарат следует принимать взрослым при начальных симптомах простуды. Внутрь по 1 -2 таблетки 3-4 раза/сут. Курс лечения - 3-5 дней.

Противопоказания

— гипоацидность желудочного сока; — печеночная недостаточность; — хроническая почечная недостаточность; — беременность; — период лактации; — детский возраст; — гиперчувствительность.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказан во время беременности и в период лактации.

Побочные действия

Возможны диспепсические расстройства, при появлении которых прием препарата следует прекратить.

Передозировка

Симптомы: резкое раздражение конъюнктивы и слизистых оболочек дыхательных путей, диспепсические расстройства (тошнота, рвота, диарея), гломерулонефрит.; Лечение: рекомендуется прием тиоктовой кислоты, фолиевой кислоты, аскорбиновой кислоты, пиридоксина и препаратов никотиновой кислоты.

Условия хранения

В сухом месте