Инструкция по применению
Кальцемин Адванс Таблетки покрытые пленочной оболочкой 30 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Макиз-Фарма
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Поливитамины+Минералы
Количество в упаковке: 30
Дозировка действующего вещества: 500 мг+ 200 МЕ+ 40 мг+ 7,5 мг+ 1 мг+ 1,8 мг+ 250 мкг



Описание

Таблетки двояковыпуклые овальной формы, покрытые пленочной оболочкой розового цвета с риской на одной стороне.

Действующее вещество

Поливитамины+Минералы

Состав

1 таблетка содержит Действующие вещества:кальций (кальция цитрат и кальция карбонат) 500 мг, витамин D3 (колекальциферол)200 МЕ, магний (магния оксид) 40 мг, цинк (цинка оксид) 7,5 мг, медь (меди оксид) 1 мг, марганец (марганца сульфат) 1,8 мг, бор (натрия борат) 250 мкг.Вспомогательные вещества: мальтодекстрин 25 мг, микрокристаллическая целлюлоза 49,05 мг, кроскармеллоза натрия 38 мг, стеариновая кислота 16,3 мг, сои полисахарид 15 мг, натрия лаурилсульфат 5 мг. Оболочка: гипромеллоза 26,328 мг, титана диоксид 12,643 мг, магния силикат 5 мг, три- ацетин 5,689 мг, минеральное масло 2,845 мг, краситель Красный № 40 (краситель крас¬ный очаровательный) 0,316 мг, краситель Желтый № 6 (солнечный закат желтый)0,079 мг, краситель Синий № 1 0,04 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика и комплексное лечение остеопороза различного генеза:- у женщин в период менопаузы (естественной и хирургической);- у лиц, длительно принимающих глюкокортикостероиды и иммунодепрессанты.Терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата: для улучшения консолидации трав-матических переломов. Для восполнения дефицита кальция и микроэлементов у подростков.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь, во время еды.Комплексная терапия остеопороза - по 1 таблетке 2 раза в день.Профилактика остеопороза - по 1 таблетке в день.При применении препарата для профилактики и в комплексной терапии остеопороза длительность лечения определяется врачом индивидуально. Средняя продолжительность курса для профилактики - 2 месяца; при лечении остеопороза - 3 месяца.Терапия заболеваний опорно-двигательного аппарата: для улучшения консолидации травматических переломов - по 1 таблетке в день; продолжительность лечения 4-6 недель.Для восполнения дефицита кальция и микроэлементов у подростков с 12 лет - по 1 таблетке в день. Средняя продолжительность лечения 4-6 недель.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, гипервитами- ноз витамина D, гиперкальциемия и гиперкальциурия, тяжелая почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, нефролитиаз, активная форма туберкулеза, саркоидоз, детский возраст (до 12 лет); аллергическая реакция на арахисовое масло и сою, так как в состав препарата входит сои полисахарид.

Применение при беременности и кормлении грудью

В период беременности и грудного вскармливания прием препарата согласовать с врачом. Суточная доза для беременных не должна превышать 1500 мг кальция и 600 МЕ витамина D3, так как гиперкальциемия, развивающаяся на фоне передозировки в период беременно-сти, может вызвать дефекты умственного и физического развития ребенка.У кормящих женщин следует учитывать, что колекальциферол и его метаболиты прони¬кают в грудное молоко. Это следует учитывать при дополнительном назначении кальция и витамина D3 ребенку.

Побочные действия

Тошнота, рвота, метеоризм, диарея, запор, гиперкальциемия и гиперкальциурия, аллерги-ческие реакции (зуд, сыпь крапивница).

Передозировка

Гипервитаминоз витамина D3, гиперкальциемия и гиперкальциурия.Симптомы: жажда, полиурия, снижение аппетита, запор, тошнота, рвота, головокружение, мышечная слабость, головная боль, обморочные состояния, кома, повышенная утомляемость, боли в костях, психические расстройства, нефрокальциноз, боль в животе, мочекаменная болезнь, в тяжелых случаях - сердечные аритмии.При длительном применении в дозах свыше 2500 мг кальция - повреждение почек, кальциноз мягких тканей.В случае обнаружения первых признаков передозировки необходимо уменьшить дозу или прекратить применение препарата, обратиться к врачу.В случае гиперкальциурии, превышающей 7,5 ммоль/сутки (300 мг/сут), необходимо уменьшить дозу или прекратить прием препарата.Лечение: регидратация, применение петлевых диуретиков (например фуросемида), глюкокортикостероидов, кальцитонина, бисфосфонатов, в тяжелых случаях проведение гемо-диализа.При случайной передозировке следует вызвать рвоту, промыть желудок. Терапия симптоматическая.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении препарата Кальцемин Адванс с витамином А умень-шается токсичность витамина D3.Фенитоин, барбитураты, глюкокортикоиды уменьшают эффективность витамина D3. Слабительные средства снижают абсорбцию витамина D3. Глюкокортикоиды, гормональ-ные противозачаточные средства для системного применения, левотироксин снижают всасывание ионов кальция. При одновременном применении тетрациклинов интервал между приемами должен быть не менее 3 часов, бисфосфонатов и натрия фторида (нарушается их всасывание) - не менее 2 часов. При одновременном применении препарата Кальцемин Адванс с сердечными гликозидами повышается их токсичность (необходим контроль ЭКГ и клинического состояния), с тиазидными диуретиками - увеличивается риск развития гиперкальциемии, с фуросемидом и другими „петлевыми” диуретиками - увеличивается выведение кальция почками. Не следует применять Кальцемин Адванс совместно с блокаторами кальциевых каналов. Не рекомендуется одновременный прием препарата с антацидами, которые содержат алюминий, из-за снижения их эффективности.

Особые указания

Доза не должна превышать указанную в инструкции, так как повышенное потребление кальция может угнетать всасывание в кишечнике железа, цинка и других необходимых минералов. Влияние на способность управлять автомобилем и движущими механизмами:Отсутствуют данные о влиянии препарата на скорость психомоторных реакций при во-ждении автомобиля и работе с точными механизмами.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.