Инструкция по применению
Календулы Настойка-Реневал 25 мл

Характеристики



Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Календулы лекарственной цветков настойка
Количество в упаковке: 1

Описание

Прозрачная жидкость от зеленовато-желтого до желтовато-коричневого цвета, с характерным запахом.

Действующее вещество

Календулы лекарственной цветков настойка

Состав

Активный компонент: Календулы лекарственной цветки (ноготков цветки) - 100 г, Вспомогательное вещество: этанол (этиловый спирт) 70% - до получения 1000 мл настойки.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах, местно - для полоскания при воспалительных заболеваниях горла (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит). Внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите в составе комплексной терапии.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностным поражением кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания полости рта и горла используют 1/2-1 стакана водного раствора настойки. Курс лечения - 1-2 недели. Внутрь, за 15 минут до еды применяют по 10-20 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день. Курс лечения 3-4 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. При применении внутрь: острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Наружное и местное применение препарата возможно, с учетом ожидаемой пользы для матери и возможного риска для плода и ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (покраснение кожи, сыпь, зуд, ангионевротический отек). При приеме внутрь - изжога, тошнота, горечь во рту, боль в животе.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Календулы настойка усиливает действие других противовоспалительных и желчегонных средств (в частности препаратов на основе ромашки и тысячелистника). При одновременном применении с любыми другими лекарственными средствами следует сообщить врачу.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, в максимальной суточной дозе - 0,7 г. Если симптомы сохраняются без улучшения более одной недели при местном применении препарата и более двух недель при применении препарата внутрь, следует обратиться к врачу. Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: В период лечения (при приеме внутрь) необходимо соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.