Инструкция по применению
Календула цветки россыпью в пачке 40 г

Характеристики

Форма выпуска: Цветки измельченные
Страна: Россия
Производитель: Фармгрупп
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Березы почки
Количество в упаковке: 1



Описание

Цветки календулы Фармгрупп уменьшают проницаемость капилляров, повышают метаболическую функцию печени (снижается концентрация холестерина и билирубина, улучшается состав желчи), стимулируют репаративные процессы в желудочно-кишечном тракте. Препарата повышает выделительную и секреторную функции. Усиливает рост грануляций, улучшает процессы регенерации, подавляет жизнедеятельность стрептококков и стафилококков. Цветки календулы обладают сложным составом. В нем присутствуют: каротиноиды, флавоноиды, сапонины, горечи (календен, арнидиол, фарадиол), смолы и вяжущие вещества, слизистые компоненты, органический полисахарид инулин, кислотные компоненты (в виде яблочной, пентадециловой, салициловой кислот), растительный стерин, аскорбиновая кислота, энзимы, алкалоидные вещества. Сочетание биоактивных ингредиентов обусловливает антивоспалительные, регенеративные, бактериостатические, анальгетические и желчегонные свойства растения. Вытяжки и настои из сырья календулы при пероральном приеме создают благоприятные условия для восстановления покровных тканей пищеварительного тракта, что способствует заживлению язвенных и эрозивных поверхностей. Также для цветов календулы свойственно снижать повышенное кровяное давление и стабилизировать коронарную функцию.

Действующее вещество

Березы почки

Состав

Цветки календулы лекарственной измельчённые.

Форма выпуска

Цветки измельченные

Показания

Местно: воспалительная патология горла (ларингит, фарингит, тонзиллит, фаринголарингит, ангина) и ротовой полости (стоматит, гингивит, пиорея, пародонтит, воспалительно-дистрофическая форма пародонтоза), трещины заднего прохода, геморрой. Внутрь (в составе комбинированного лечения): хронический гастрит, холангит, холецистит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Наружно: ушибы, порезы, экзема, гнойные раны, ожоги, укусы комаров.

Способ применения и дозы

1 чайную ложку (2,0 г) залить 1 стаканом (200 мл) кипятка, настаивать на водяной бане 15 минут, процедить, принимать взрослым по 1 стакану (200 мл) настоя 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема – 1 месяц.

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование.

Особые указания

БАД. Не является лекарственным средством.

Условия хранения

Хранение в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте при температуре не выше +25°C. Готовый настой хранить в холодильнике не более 2-х суток.