
Инструкция по применению
Календулы Настойка 25 мл

Характеристики

Форма выпуска: Настойка
Страна: Россия
Производитель: Флора Кавказа
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачная жидкость желтовато-коричневого цвета со специфическим запахом.

Состав

Ноготков цветки - 100 г. Этанол (этиловый спирт) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл препарата.

Форма выпуска

Настойка

Показания

Применяют наружно как антисептическое и противовоспалительное средство при порезах, ушибах, экземах местно - для полоскания горла при воспалительных заболеваниях глотки (тонзиллит, фарингит, ларингит) и слизистой оболочки полости рта (стоматит, гингивит, пародонтит) внутрь настойку календулы применяют при холецистите, холангите.

Способ применения и дозы

Наружно, местно, внутрь. Участки с поверхностными повреждениями кожных покровов (порезы) обрабатывают настойкой с помощью тампона. При ушибах и экземе применяют водный раствор настойки (1 чайную ложку на стакан воды) в виде примочек. Для полоскания горла и слизистой оболочки полости рта используют 1/4-1 стакан водного раствора настойки. Курс лечения - 1-2 недели. Внутрь за 15 минут до еды применяют по 10-20 капель, разведенных в 1/4 стакана воды, 3 раза в день. Курс лечения - 3-4 недели.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. При применении внутрь - острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения, калькулезный холецистит, беременность, период грудного вскармливания, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение препарата внутрь при беременности и в период грудного вскармливания. Возможно наружное и местное применение препарата с учетом ожидаемой пользы для матери и возможного риска для плода или ребенка. Необходима консультация врача.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (в т.ч. кожный зуд). При приеме внутрь - изжога, тошнота, горечь во рту, боль в животе.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

В настоящее время не изучено.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата составляет 0,23 г, содержание абсолютного этилового спирта в максимальной суточной дозе 0,7 г. При приеме внутрь необходимо соблюдать осторожность при занятии потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.