Инструкция по применению
Калгель Гель зубной 10 г

Характеристики



Форма выпуска: Гель
Страна: Польша
Производитель: Хелеон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество:
Лидокаин+Цетилпиридиния хлорид
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Действующее вещество

Лидокаин+Цетилпиридиния хлорид

Состав

Действующее вещество: лидокаина гидрохлорид 3, 3 мг и цетилпиридиния хлорид 1, 0 мг. Вспомогательные вещества: сорбитола раствор 70%, некристаллизующийся, ксилитол, этанол, глицерол, гидроксиэтилцеллюлоза 5000, макрогол-40 гидрогенизированный концентрат касторового масла, лауромакрогол, макрогол 300, натрия сахаринат, левоментол, ароматизатор растительный 17. 42. 5490, карамель Е 150, вода очищенная. Концентрация действующего вещества (мг): 4, 3 мг

Форма выпуска

Гель

Фармакокинетика

Данные о фармакокинетике препарата Калгель не предоставлены.

Показания

Болевой синдром при прорезывании зубов у детей с 5-месячного возраста.

Способ применения и дозы

Местно. Перед применением Калгеля обязательно проконсультируйтесь с педиатром. Небольшое количество геля (около 7, 5 мм) наносят на кончик чистого пальца и осторожно втирают в воспаленный участок десны ребенка. При необходимости гель можно наносить повторно с интервалом не менее 20 минут, но не чаще 6 раз в день.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к лидокаину, цетилпиридину или любому другому компоненту препарата Калгель. Почечная или печеночная недостаточность, артериальная гипотензия, сердечная недостаточность II-III степени, нарушение внутрижелудочковой проводимости, брадикардия.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат предназначен для детей

Побочные действия

Возможны аллергические реакции (крапивница, зуд, анафилактический шок). Возможно нарушение глотания. Если во время применения геля появляются признаки аллергии, то препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Передозировка

Снижение глоточной чувствительности, сопровождающееся нарушением глотания, может быть теоретическим результатом избыточного проглатывания геля при его местном использовании. Однако даже при неправильном или избыточном использовании Калгеля маловероятным считается развитие клинически значимых токсических побочных эффектов. В случае передозировки необходимо отменить Калгель и обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не отмечено взаимодействия Калгеля с другими лекарственными препаратами. Отмечается лекарственное взаимодействие между внутривенно назначаемым лидокаином и прокаинамидом, фенитоином, фенитоином в комбинации с фенобарбиталом, примидоном или карбамазепином, пропанолом и калий-несберегающими диуретиками, включая буметанид, фуросемид, тиазид. Однако маловероятно наличие данных взаимодействий у зубного геля Калгель. В случае необходимости применения других препаратов проконсультируйтесь с врачом.

Особые указания

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом-педиатром. Не следует превышать рекомендованные дозы, т. к. необходимо учитывать возможность проглатывания препарата при кормлении и во время сна.

Условия хранения

В сухом месте