Инструкция по применению
Калинактив сироп 135 г

Характеристики

Форма выпуска: Сироп
Страна: Россия
Производитель: Вифитех
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Калины плоды
Количество в упаковке: 1



Описание

Густая жидкость от оранжево-красного до темно-красного цвета с характерным запахом. Допускается наличие незначительного студневидного осадка, растворяющегося при нагревании до 40 °С.

Действующее вещество

Калины плоды

Состав

Для приготовления 100 г препарата необходимо: Калины плодов свежих - достаточное количество до получения 36 г сока, Сахара (сахароза) - 64 г.

Форма выпуска

Сироп

Показания

В комплексном лечении "простудных" заболеваний в период выздоровления после перенесенных заболеваний.

Способ применения и дозы

Внутрь после еды. Взрослым и детям старше 12 лет - по 1 столовой ложке (15 мл) 3-5 раз в день. Детям от 6 до 12 лет - по 1 десертной ложке (10 мл) 3-5 раз в день детям от 3 до 6 лет - по 1 чайной ложке (5 мл) 3-5 раз в день. Длительность лечения - 3-4 недели. Повторные курсы возможны по согласованию с врачом.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки панкреатит в фазе обострения врожденная непереносимость фруктозы глюкозо-галактозная мальабсорбция дефицит сахаразы/изомальтазы. Если у Вас одно из перечисленных заболеваний перед приемом препарата обязательно проконсультируйтесь с врачом. Препарат не рекомендуется для применения у детей в возрасте до 3-х лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности.

Применение при беременности и кормлении грудью

Не рекомендуется применять при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Необходимо учитывать что в 1 чайной ложке сиропа содержится около 45 г сахарозы (038 ХЕ) в 1 десертной ложке - около 90 г сахарозы (076 ХЕ) в 1 столовой ложке - около 135 г сахарозы (114 ХЕ). Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.: Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом работа с движущимися механизмами работа диспетчера и оператора и т.п.).

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.