Инструкция по применению
Калия оротат Таблетки 500 мг 50 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Обновление ПФК АО
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Оротовая кислота
Количество в упаковке: 50
Дозировка действующего вещества: 500 мг

Описание

Круглые плоскоцилиндрические таблетки белого цвета с фаской, с риской на одной стороне.

Действующее вещество

Оротовая кислота

Состав

На одну таблеткуДействующее вещество:Калия оротат -500,0 мг/Вспомогательные вещества:лактозы моногидрат - 165,0 мг,крахмал картофельный - 55,0 мг,повидон К-17 - 22,5 мг,кальция стеарат - 7,5 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

После приема внутрь в желудочно-кишечном тракте абсорбируется 10 % принятой внутрь дозы. В печени превращается в оротидин-5-фосфат.Выводится почками (30 % в виде метаболитов).

Показания

В качестве вспомогательного средства при заболеваниях печени и желчных путей (вызванных острой и хронической интоксикацией, за исключением органических поражений печени и желчевыводящих путей), в составе комбинированной терапии хронической сердечной недостаточности и нарушениях ритма сердца, алиментарной и алиментарно-инфекционной гипотрофии у детей, хроническое физическое перенапряжение.

Способ применения и дозы

Следует принимать внутрь за 1 час до еды или через 4 часа после еды. Взрослым по 250-500 мг 2-3 раза в сутки. Курс лечения длится в среднем 20- 30 дней. При необходимости лечение можно повторить через 1 месяц. Висключительных случаях можно увеличить дозу взрослых до 3 г в сутки. Детям - по 10-20 мг/кг массы тела в сутки, разделенные на 3-4 приема (например, если масса тела ребенка 25 кг, то разрешенная доза - от 25 х 10 =250 мг (1/2табл.) до 25 х 20 = 500 мг (1 табл. в сутки, разделенные на 3-4 приема). Курс лечения 3-5 недель.При сохранении симптомов болезни проконсультируйтесь с врачом.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата, острое и хроническое органическое поражение печени, асцит, нефроуролитиаз, почечная недостаточность, непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат применять с осторожностью при беременности и кормлении грудью.

Побочные действия

Обычно Калия оротат хорошо переносится. В отдельных случаях могут возникать аллергические кожные реакции, которые исчезают после прерывания лечения. Калия оротат может также вызвать легкие расстройства пищеварения (тошнота, рвота). При применении в высоких дозах на фоне малобелковой диеты возможно развитие дистрофии печени.При появлении побочных действий проконсультируйтесь с врачом.

Передозировка

Данные по передозировке отсутствуют.

Взаимодействие с другими препаратами

Калия оротат несколько снижает токсичность сердечных гликозидов, эффект повышается при его комбинации с препаратами магния. Вяжущие и обволакивающие средства могут несколько снизить всасывание калия оротата в желудочно-кишечном тракте. Калия оротат затрудняет усвоение железа, тетрациклина, натрия фторида (интервал между приемом лекарственного средства - не менее 2-3-ч). Пероральные контрацептивы, диуретики миорелаксанты, глюкокортикостероиды, инсулин снижают эффект препарата.

Особые указания

В период лечения желательным является соблюдение диеты.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Не вызывает сонливости и уменьшения скорости психомоторных реакций.

Условия хранения

В оригинальной упаковке (пачке) при температуре не выше 25 °С.Хранить в недоступном для детей месте.