Инструкция по применению
Калькохель Таблетки для рассасывания 50 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Heel
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Гомеопатический состав
Количество в упаковке: 50
Срок годности: 60



Описание

Биорегуляционный немецкий препарат. Применяется в комплексной терапии нарушений кальциевого обмена в организме.

Действующее вещество

Гомеопатический состав

Состав

(на 1 таблетку): Активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni (Кальциум карбоникум Ганеманни) D8 180 мг, Solanum dulcamara (Солянум дулькамара) D6 30 мг, Matricaria recutita (Матрикария рекутита) D4 30 мг, Carbo vegetabilis (Карбо вегетабилис) D12 60 мг, Вспомогательные вещества: магния стеарат 1,5 мг, лактозы моногидрат до получения таблетки массой около 0,302 г.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комплексной терапии нарушений кальциевого обмена в организме.

Способ применения и дозы

Лицам старше 12 лет и взрослым, по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Детям с 6 до 12 лет по 1 таблетке 2 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. Средний курс лечения - 5 недель, максимально возможный курс лечения - 6 месяцев.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Возраст до 6 лет, в связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу. Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. Пенал закрывать сразу после применения препарата.

Условия хранения

В сухом месте