Инструкция по применению
Каметон Спрей для местного применения 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Аэрозоль
Страна: Россия
Производитель: Алтайвитамины
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Камфора+Хлоробутанол+Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол]
Количество в упаковке: 1



Описание

Содержимое баллона - маслянистая, прозрачная, бесцветная жидкость с характерным запахом, образующая при выходе из баллона конус диспергированных в воздухе частиц жидкости.

Действующее вещество

Камфора+Хлоробутанол+Эвкалипта прутовидного листьев масло+[Левоментол]

Состав

15 г 30 г Действующие вещества: Хлоробутанола гемигидрат 0,15 г 0,3 г Камфора рацемическая 0,15 г 0,3 г Левоментол 0,15 г 0,3 г Эвкалиптовое масло 0,15 г 0,3 г Вспомогательные вещества: Этанол (спирт этиловый 95%) 0,6 г 1,2 г Изопропилмиристат 13,8 г 27,6 г

Форма выпуска

Аэрозоль

Показания

Воспалительные заболевания ЛОР-органов (в т.ч. ринит, фарингит, ларингит).

Способ применения и дозы

Местно. Распыляют в ротовую полость (вправо и влево) и носовые ходы (предварительно очистив их от слизи, слегка наклонив голову вперед, в каждую ноздрю, на фазе вдоха). Взрослым и детям старше 15 лет - по 1-3 распыления. Дети в возрасте от 12 до 15 лет - по 1-2 распыления. Дети от 5 до 12 лет - по 1 распылению. Частота применения - 3-4 раза в сутки. Курс лечения -7-10 дней. При первом использовании препарата или перерыве в его использовании более 1 суток следует произвести несколько нажатий до появления дисперсной струи, после чего препарат можно применять. При применении препарата баллон держать вертикально, распылителем кверху, нельзя пользоваться баллоном в перевернутом состоянии. Если через указанный курс лечения (7-10 дней) улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы необходимо проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

Гиперчувствительность. Индивидуальная непереносимость компонентов препарата. Детский возраст до 5 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказания к применению препарата у женщин в состоянии беременности и женщин, кормящих грудью, не выявлены.

Побочные действия

Аллергические реакции в виде сыпи, зуда и покраснения кожи. В случае проявления необычных реакций следует посоветоваться с врачом о целесообразности дальнейшего применения препарата.

Передозировка

Признаки острого отравления при попадании внутрь: тошнота, рвота, боли в желудке. Пострадавшему следует немедленно обратиться к врачу. Меры помощи при передозировке: удаление препарата из желудка и кишечника (промывание желудка, искусственная рвота, использование солевых слабительных, клизма, применение кишечных адсорбентов - активированного угля), симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Клинически значимого взаимодействия препарата с лекарственными препаратами других групп не выявлено.

Особые указания

Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Применение препарата не оказывает влияния на управление транспортными средствами и выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

При температуре от 0 до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.