Инструкция по применению
Камфорное ТФФ Масло 10 % 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Масло
Страна: Россия
Производитель: Тульская ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Камфора
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 10%



Действующее вещество

Камфора

Состав

В 1 флаконе: Камфора рацемическая 3 млВспомогательные вещества: масло подсолнечное до 1 мл.

Форма выпуска

Масло

Фармакокинетика

После п/к введения камфора хорошо проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком.Выводится почками (70%), а также через легкие (20%) и с желчью (10%).

Показания

Артралгия,Миалгия,Миозит,Ишиас,Радикулит,Профилактика развития пролежней.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят на пораженные и болезненные участки в виде компрессов, растираний 2 - 3 раза в день. Продолжительность лечения – 7 - 10 суток.

Противопоказания

Гиперчувствительность,Склонность к судорожным реакциям,Нарушение целостности кожных покровов,Воспалительные заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения.

Применение при беременности и кормлении грудью

Учитывая высокую проницаемость камфоры через ГЭБ, плацентарный барьер и в грудное молоко, применение камфоры при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) необходимо проводить с осторожностью.

Побочные действия

Крапивница;Раздражение кожи;Головная боль, головокружение.

Передозировка

Симптомы: возбуждение, тахикардия, судороги.Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими препаратами

При одновременном применении снижает абсорбцию жирорастворимых витаминов A, D и K. В дозах до 4 г/сут увеличивает абсорбцию жирорастворимых лекарств – экстракта мужского папоротника, мебендазола, гризеофульвина, пробукола.При одновременном применении с солевыми слабительными возможно резкое усиление слабительного эффекта.М-холиноблокирующие средства (атропина сульфат, платифилин, пирензепин), спазмолитические средства (папаверин, дротаверин) ослабляют действие масла касторового.Антихолинэстеразные средства (неостигмин, пиридостигмин, ривастигмин) и глицерин усиливают слабительное действие масла касторового.Усиливает действие средств, стимулирующих сократительную активность миометрия (метилэргометрина, эргометрина, окситоцина, простагландинов) вплоть до возникновения угрозы разрыва матки в родах.При местном применении увеличивает чрезкожную абсорбцию лекарственных средств, наносимых совместно с ним на кожу.

Особые указания

Возможны алергические кожные реакции