Инструкция по применению
Камфорный спирт 2% 40 мл

Характеристики

Форма выпуска: Раствор
Страна: Россия
Производитель: МОСКОВСКАЯ ФФ
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Камфора
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 2%
Срок годности: 2



Описание

Препарат с анальгезирующим и местноанестезирующим действием для наружного применения

Действующее вещество

Камфора

Состав

Камфора

Форма выпуска

Раствор

Фармакокинетика

После п/к введения камфора хорошо проникает через ГЭБ и плацентарный барьер, выделяется с грудным молоком. Выводится почками (70%), а также через легкие (20%) и с желчью (10%).

Показания

Наружно: миозиты, невралгии, профилактика пролежней. П/к: сердечная недостаточность, коллапс, угнетение дыхательного центра при инфекционных заболеваниях (в т.ч. при пневмонии), при отравлении снотворными средствами и опиоидными анальгетиками.

Способ применения и дозы

Индивидуальный, в зависимости от показаний и применяемой лекарственной формы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к камфоре. Эпилепсия (для п/к введения). Нарушение целостности кожных покровов (для наружного применения).

Применение при беременности и кормлении грудью

Учитывая высокую проницаемость камфоры через ГЭБ, плацентарный барьер и в грудное молоко, применение камфоры при беременности и в период лактации (грудного вскармливания) необходимо проводить с осторожностью.

Побочные действия

При наружном применении: кожные аллергические реакции, раздражение кожи. При п /к введении: головная боль, головокружение, олеогранулема (в месте инъекции), жировая эмболия (при попадании в сосуд).

Особые указания

С осторожностью следует применять у детей.

Условия хранения

Беречь от детей, При комнатной температуре.