Инструкция по применению
Камистад Бэби Гель 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: Нижфарм
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1



Описание

Прозрачный, желто-коричневый гель с запахом и вкусом ромашки, меда, мяты. В ваших руках помочь своему малышу перенести период прорезывания зубов более комфортно. Наносите Камистад Бэби гель 2-3 раза в день на десны, втирая его легкими массирующими движениями после еды и перед сном. Благодаря комплексному составу Камистад Бэби охлаждает и успокаивает раздраженную слизистую и ухаживает за чувствительными деснами. Средство не содержит сахар, спирт, красители и лидокаин.

Состав

вода, пропиленгликоль, экстракт цветков ромашки аптечной, гидролизат гидрогенизированного крахмала, глицерин, трометамин, карбомер, лаурет-9, гиалуронат натрия, медовый ароматизатор, ацесурфам калия, охлаждающий ароматизатор, динатрия ЭДТА. Камистад Бэби рекомендован при первых признаках прорезывания зубов у детей. Экстракт цветков ромашки аптечной обладает успокаивающими свойствами, способствует заживлению раздраженной слизистой оболочки полости рта, ухаживает за чувствительными деснами и помогает снять воспаление. Лаурет-9 (полидоканол) обладает охлаждающим и отвлекающим действием. Гиалуронат натрия (Гиалуроновая кислота) оказывает увлажняющее действие. Ароматизаторы (медовый и охлаждающий) придают гелю Камистад Бэби приятный вкус.

Форма выпуска

Гель

Показания

Гель для местного применения - разрешено для производства, реализации, использования в качестве средства гигиены полости рта для детей. Камистад® Бэби рекомендован при первых признаках прорезывания зубов у детей.

Способ применения и дозы

небольшое количество геля выдавить на чистые руки или ватную палочку и распределить по поверхности десны, слегка втирая. Наносить 2-3 раза в день, желательно после еды и перед сном.

Противопоказания

Не применять при индивидуальной непереносимости компонентов, возможны аллергические реакции.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если во время применения Камистада, появились признаки аллергии, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.