
Инструкция по применению
Камистад Гель для местного применения 10 г

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Германия
Производитель: Штада
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Лидокаин+Ромашки аптечной цветков экстракт
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 5 г
Срок годности: 60.0



Описание

Гель желто-коричневого цвета

Действующее вещество

Лидокаин+Ромашки аптечной цветков экстракт

Состав

Состав на 1 г: действующие вещества: лидокаина гидрохлорида моногидрат — 20,0 мг, ромашки аптечной цветков экстракт (1:4-5) (экстрагент — этанол 50 % (об) с трометамолом 1,37 %) — 185,0 мг, вспомогательные вещества: бензалкония хлорид 50 % раствор, коричника камфорного масло, натрия сахаринат, карбомер, трометамол, муравьиная кислота 98 %, этанол 96 %, вода очищенная.

Форма выпуска

Гель

Показания

Болевой синдром при воспалении слизистой оболочки полости рта и губ (при стоматите, хейлите, глетчерной эритеме губ), гингивите (воспалении десен), раздражении слизистой оболочки полости рта при ношении зубных протезов и брекетов, прорезывании зубов «мудрости», стоматологических процедурах, после ортопедических операций в челюстно-лицевой хирургии.

Способ применения и дозы

Местно. Полоску препарата длиной 0,5 см наносят на болезненные или воспаленные участки слизистой оболочки полости рта и губ 3 раза в день, втирая легкими массирующими движениями. На период привыкания к зубным протезам в места сдавливания втирать полоску геля длиной 0,5 см. Курс лечения зависит от тяжести заболевания.

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст (до 12 лет).

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. Если во время применения Камистада® появились признаки аллергии, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Передозировка

О случаях передозировки препарата не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными препаратами не описаны.

Особые указания

Не допускается попадание препарата в глаза. До и после применения геля рекомендуется вымыть руки. Камистад® содержит сахарозаменитель натрия сахаринат.

Условия хранения

В сухом месте