Инструкция по применению
Кандид Крем 1 % 20 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Клотримазол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 36



Описание

Крем Кандид - это лекарственное противогрибковое средство широкого спектра действия для местного применения, антибактериальное, противопротозойное, трихомонацидное. Антимикотический эффект активного действующего вещества клотримазола (производное имидазола) связан с нарушением синтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов, что изменяет проницаемость мембраны и вызывает последующий лизис клетки. Применяется при грибковых заболеваниях кожи, микозах кожных складок, стоп, отрубевидном лишае, эритразме, поверхностных кандидозах, вызванные дерматофитами, дрожжевыми (включая род Candida), плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу. Крем наносят тонким слоем 2-3 раза в день на предварительно очищенные (с применением мыла с нейтральным значением pH) и высушенные пораженные участки кожи и осторожно втирают. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, локализация патологических изменений и эффективности терапии.

Действующее вещество

Клотримазол

Состав

Каждый грамм препарата содержит: Активное вещество: клотримазол 10,0 мг Вспомогательные вещества: пропиленгликоль 50,0 мг, вазелин белый 120,0 мг, парафин жидкий 60,0 мг, воск эмульсионный цетомакрогольный 135,0 мг, бензиновый спирт 10,0 мг, метилпарагидроксибензоат 1,5 мг, пропилпарагидроксибензоат 0,5 мг, бутилгидрокситолуол 1,0 мг, натрия дигидрофосфата дигидрат 0,8 мг, натрия гидрофосфат 0,6 мг, вода очищенная до 1000 мг.

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Клотримазол плохо всасывается через кожу и слизистые оболочки и практически не оказывает системного действия. Концентрация в глубоких слоях эпидермиса выше, чем минимальная подавляющая концентрация для дерматофитов. При наружном применению концентрация клотримазола в эпидермисе выше, чем в дерме и подкожной клетчатке.

Показания

\- Грибковые заболевания кожи, микозы кожных складок, стоп; \- Отрубевидный лишай, эритразма, поверхностные, кандидозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми (включая род Candida), плесневыми и другими грибами и возбудителями, чувствительными к клотримазолу; \- Микозы, осложненные вторичной пиодермией.

Способ применения и дозы

Наружно. Крем наносят тонким слоем 2-3 раза в день на предварительно очищенные (с применением мыла с нейтральным значением pH) и высушенные пораженные участки кожи и осторожно втирают. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, локализация патологических изменений и эффективности терапии. Лечение дерматомикозов проводят не менее 4 недель, отрубевидного лишая -1-3 недель. При грибковых заболеваниях кожи ног терапию рекомендуется продолжить еще в течение не менее 2 недель после устранения симптомов заболевания.

Противопоказания

\- Гиперчувствительность к клотримазолу или другим компонентам препарата \- I триместр беременности. С осторожностью: Период лактации. Беременность и лактация: При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение препарата в период беременности или в период кормления грудью оказывает отрицательное влияние на здоровье женщины или плода (ребенка). Однако вопрос, о целесообразности назначения препарата во II или Ш триместре должен решаться индивидуально после консультации с врачом. При назначении препарата во время II или III триместров беременности следует учитывать соотношение предполагаемой пользы от назначения препарата для матери и возможного риска для плода. Нанесение препарата непосредственно на лактирующую молочную железу противопоказано.

Применение при беременности и кормлении грудью

Острая передозировка при местном применении раствора Кандид маловероятна и не приводит к ситуации, представляющей угрозу для жизни.

Побочные действия

Применение, крема в повышенных дозах не вызывает каких-либо реакций и состояний,опасных для жизни.

Передозировка

Зуд, жжение и отек слизистой оболочки влагалища, выделения из влагалища, головная боль, гастралгия, учащенное мочеиспускание, интеркуррентный цистит, ощущение жжения в половом члене у полового партнера, боль во время полового акта.

Особые указания

Не рекомендуется нанесение препарата на кожу в области глаз. У больных с печеночной недостаточностью следует периодически контролировать функциональное состояние печени. При появлении признаков гиперчувствительности или раздражения лечение прекращают. При отсутствии эффекта в течение 4 недель следует подтвердить диагноз. Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами: Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и механизмами.

Условия хранения

В сухом месте