# Инструкция по применению
# Кандид Раствор для полости рта 1 % 15 мл

## Характеристики




Форма выпуска: Раствор
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Клотримазол
Количество в упаковке: 1
Дозировка действующего вещества: 1%
Срок годности: 36.0

## Действующее вещество

Клотримазол

## Форма выпуска

Раствор

## Способ применения и дозы

Местно, 10–20 капель (0,5–1 мл) наносят на пораженные участки полости рта с помощью ватной палочки 3–4 раза в день.  Улучшение состояния наступает обычно на 3–5 день лечения. Продолжительность лечения — до полного устранения клинических проявлений заболевания.

## Передозировка

Применение препарата в повышенных дозах не вызывает каких-либо реакций и состояний, опасных для жизни. Симптомы (в случае непредусмотренного применения препарата внутрь): анорексия, тошнота, рвота, гастралгия, нарушение функции печени; редко — сонливость, галлюцинации, поллакиурия, кожные аллергические реакции. Лечение: назначение активированного угля, при необходимости — симптоматическая терапия; специфического антидота нет.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Препарат предназначен для использования только в дерматологической практике. Необходимо избегать применения препарата на участках кожи с нарушением целостности кожных покровов. Следует учитывать, что при наружном применении глюкокортикоидов на больших участках кожи или с окклюзионными повязками возможна их системная абсорбция. При применении окклюзионных повязок возможно развитие сыпи, фолликулита, пиодермии.

**Особые указания**

Препарат предназначен для использования только в дерматологической практике. Необходимо избегать применения препарата на участках кожи с нарушением целостности кожных покровов. Следует учитывать, что при наружном применении глюкокортикоидов на больших участках кожи или с окклюзионными повязками возможна их системная абсорбция. При применении окклюзионных повязок возможно развитие сыпи, фолликулита, пиодермии.

**Условия хранения**

В сухом месте