Инструкция по применению
Кандидерм Крем 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Индия
Производитель: Гленмарк
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Беклометазон+Гентамицин+Клотримазол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36



Действующее вещество

Беклометазон+Гентамицин+Клотримазол

Состав

1 мл препарата содержит: Действующее вещество: Аморолфина гидрохлорид, 55,70 мг в пересчете на аморолфин 50,00 мг Вспомогательные вещества: Триацетин (глицерола триацетат) 10,50 мг Метилметакрилата, триметиламмониоэтилметакрилата хлорида и этилакрилата сополимер [2:0.2:1] (аммония метакрилата сополимер (Тип А) (Eudragit RL 100)) 125,00 мг Этилацетат (глицерола триацетат) 150,00 мг Бутилацетат 50,00 мг Этанол безводный.

Форма выпуска

Крем

Показания

дерматозы, осложненные вторичной инфекцией; эпидермофития стоп; дерматомикозы (в т.ч. с локализацией в паховой области), вызванные чувствительными к препарату возбудителями.

Способ применения и дозы

Наружно, наносят тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в сутки (утром и вечером). Продолжительность лечения зависит от эффективности и переносимости терапии и составляет, как правило, 2–4 нед. (не более). Детям (7–16 лет) препарат назначают строго под контролем врача, т.к. возможно развитие системных побочных эффектов, связанных с беклометазоном. При применении препарата на обширных поверхностях и/или под окклюзионной повязкой возможно подавление функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы и развитие симптомов гиперкортицизма, может наблюдаться снижение экскреции гормона роста, повышение ВЧД.

Противопоказания

повышенная чувствительность к компонентам препарата; туберкулез кожи; кожные проявления сифилиса; ветряная оспа; простой герпес; кожные реакции после вакцинации; открытые раны; беременность; период лактации; детский возраст до 7 лет.

Побочные действия

Чувство жжения, гиперемия, эритема, шелушение, отек, сухость, мацерация и атрофия кожи, стрии, гипертрихоз, фолликулит, потница, крапивница, стероидные угри, периоральный дерматит, аллергический контактный дерматит, телеангиэктазия, гипопигментация, пиодермия, фурункулез. При длительном применении возможны системные побочные эффекты, в т.ч. угнетение функции коры надпочечников.

Передозировка

Возможно развитие симптомов гиперкортицизма - увеличение массы тела, образование отеков, гипертензия, глюкозурия, гипокалиемия. Лечение: симптоматическая терапия, при необходимости проводят коррекцию электролитного баланса. Рекомендуется постепенная отмена препарата.

Взаимодействие с другими препаратами

Не выявлено.

Особые указания

Препарат не применяют в офтальмологии. Не следует наносить на кожу в области глаз. С целью повышения эффективности терапии возможно использование окклюзионных повязок. Необходимо учитывать, что при этом усиливается трансдермальное всасывание беклометазона и гентамицина, которое ведет к увеличению риска развития системных побочных эффектов. При проявлении устойчивой бактериальной или грибковой микрофлоры следует прекратить применение препарата и назначить соответствующую терапию. Возможно развитие перекрестной резистентности с аминогликозидными антибиотиками.

Условия хранения

Не допускать замерзания