Инструкция по применению
Кандид-Б Крем 1 % 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Крем
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Беклометазон+Клотримазол
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0



Действующее вещество

Беклометазон+Клотримазол

Состав

Действующее вещество: * клотримазола 10 мг, * беклометазона 250 мкг. Вспомогательные вещества: * белое вазелиновое желе, * жидкий парафин, * цетомоакроголь воск, * бензиловый спирт, * метилпарабен, * пропилпарабен, * бутилированный гидрокситолуол, * пропиленгликоль, * однозамещенный фосфат натрия, * безводный фосфорнокислый натрий, * очищенная вода. Концентрация действующего вещества (мг): 10, 25 мг

Форма выпуска

Крем

Фармакокинетика

Резорбция составляет 3–10% введенной дозы.

Показания

Грибковые инфекции кожи, особенно сопровождающиеся острыми экзематозными проявлениями: * паховая эпидермофития, * эпидермофития стоп, * микроспория гладкой кожи, * кандидоз, обусловленный Candida albicans.

Способ применения и дозы

Наружно, на предварительно промытые и высушенные пораженные участки кожи, слегка втирая, наносят тонким слоем 2–3 раза в день. При паховой эпидермофитии, микроспории гладкой кожи и кандидозе курс лечения - 2 недели. При эпидермофитии стоп - 4 недели. При необходимости длительного применения следует применять реже, через день. При терапии хронических заболеваний лечение следует продолжить еще некоторое время после исчезновения всех симптомов, чтобы избежать рецидива заболевания.

Противопоказания

* Гиперчувствительность. * Туберкулез кожи. * Поствакцинальные кожные реакции. * Простой герпес. * Кожные проявления сифилиса. * Актиномикоз, бластомикоз, споротрихоз. * Трофические язвы на фоне хронической венозной недостаточности. * Опухоли кожи. * Период грудного вскармливания.

Применение при беременности и кормлении грудью

При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение Кандида-Б 6 во время беременности и в период грудного вскармливания отрицательно воздействует на здоровье женщины или плода. Однако вопрос о назначении препарата должен решаться врачом индивидуально. В этом случае использование аппликатора не рекомендуется.

Побочные действия

Побочные эффекты, как правило, носят слабовыраженный характер. Возможны местные аллергические реакции: * покраснение кожи, * ощущение жжения и покалывания в месте нанесения препарата. Редко, как и при применении других ГКС, могут развиваться акнеподобные изменения, гипопигментация, стрии, атрофия кожи, гипертрихоз, телеангиэктазии, вторичные инфекции кожи.

Передозировка

При использовании Кандида в повышенных дозировках не отмечается состояний и реакций, представляющих опасность для жизни. При случайном приеме Кандида внутрь возможно появление тошноты, рвоты, анорексии, гастралгии, нарушений функций печени, в редких случаях - появление сонливости, галлюцинаций, кожных аллергических реакций, поллакиурии. Специфического антидота не существует. Назначают активированный уголь, проводят симптоматическую терапию.

Взаимодействие с другими препаратами

При вагинальном введении снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков. При одновременном применении с нистатином активность Кандида-Б 6 может понижаться.

Особые указания

Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение обоих половых партнеров. При трихомониазе для более успешного лечения совместно с препаратом Кандид-В 6 следует назначать другие ЛС, обладающие системным действием, например метронидазол. Вагинальные таблетки не рекомендуется использовать во время менструации.

Условия хранения

В сухом месте