Инструкция по применению
Кандид в6 Таблетки вагинальные с аппликатором 6 шт

Характеристики



Форма выпуска: Таблетки
Страна: Индия
Производитель: Glenmark Pharmaceuticals
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Клотримазол
Количество в упаковке: 6
Дозировка действующего вещества: 100 мг
Срок годности: 48.0

Действующее вещество

Клотримазол

Состав

1 таблетка содержит: Активное вещество: клотримазол 100 мг. Вспомогательные вещества: адипиновая кислота - 70 мг, крахмал кукурузный - 260 мг, кремния диоксид коллоидный - 2.67 мг, лактозы моногидрат - 483.33 мг, магния стеарат - 4 мг, метилпарагидроксибензоат - 0.8 мг, натрия гидрокарбонат - 54.67 мг, карбоксиметилкрахмал натрия - 42 мг, повидон К-30 - 12.67 мг, пропилпарагидроксибензоат - 0.2 мг, тальк - 10 мг.

Форма выпуска

Таблетки

Фармакокинетика

Резорбция составляет 3–10% введенной дозы.

Показания

Генитальные инфекции, вызванные дрожжеподобными грибами рода Candida и/или Ttrichomonas vaginalis (кандидозный вульвовагинит, трихомониаз); Генитальные суперинфекции, вызванные микроорганизмами, чувствительными к клотримазолу; Санация родовых путей перед родами.

Способ применения и дозы

Препарат применяют интравагинально. Таблетки следует вводить как можно глубже во влагалище, лежа на спине при слегка согнутых ногах. Назначают по 100 мг (1 таб.) 1 раз/сут (вечером) в течение 6 дней. Повторный курс лечения возможен после консультации врача. Для санации родовых путей перед родами рекомендуется однократное введение 1 таблетки. Инструкция по использованию аппликатора 1. Выдвинуть поршень аппликатора до упора. Поместить одну вагинальную таблетку в аппликатор. 2. Осторожно вставить аппликатор с таблеткой максимально глубоко во влагалище (лучше всего в положении лежа на спине при слегка согнутых ногах). 3. Ввести таблетку во влагалище, медленно нажимая на поршень аппликатора до упора. 4. Извлечь аппликатор. 5. После использования и перед повторным использованием полностью извлечь поршень из аппликатора, промыть поршень и аппликатор теплой (не горячей) мыльной водой и вытереть насухо.

Противопоказания

повышенная чувствительность к клотримазолу; I триместр беременности. С осторожностью: период лактации.

Применение при беременности и кормлении грудью

При клинических и экспериментальных исследованиях не было установлено, что применение Кандида-В 6 во время беременности и в период грудного вскармливания отрицательно воздействует на здоровье женщины или плода. Однако вопрос о назначении препарата должен решаться врачом индивидуально. В этом случае использование аппликатора не рекомендуется.

Побочные действия

Возможно: зуд, жжение и отек слизистой оболочки влагалища, выделения из влагалища, головная боль, гастралгия, учащенное мочеиспускание, интеркуррентный цистит, ощущение жжения в половом члене у полового партнера, боль во время полового акта.

Взаимодействие с другими препаратами

При вагинальном введении снижает активность амфотерицина В и других полиеновых антибиотиков. При одновременном применении с нистатином активность Кандида-В 6 может понижаться.

Особые указания

Для предотвращения урогенитальной реинфекции необходимо одновременное лечение обоих половых партнеров. При трихомониазе для более успешного лечения совместно с препаратом Кандид-В 6 следует назначать другие ЛС, обладающие системным действием, например метронидазол. Вагинальные таблетки не рекомендуется использовать во время менструации.

Условия хранения

В сухом месте