Инструкция по применению
Канефрон Н Таблетки 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки покрытые оболочкой
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Измельченное сырье золотысячника травы+корня любистока лекарственного+листьев розмарина
Количество в упаковке: 60
Срок годности: 36.0



Описание

.

Действующее вещество

Измельченное сырье золотысячника травы+корня любистока лекарственного+листьев розмарина

Состав

1 таблетка содержит: измельченное лекарственное растительное сырье: * трава золотысячника 18 мг, * корни любистока лекарственного 18 мг, * листья розмарина 18 мг. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный - 15 мг, кремния диоксид коллоидный - 5.5 мг, лактозы моногидрат - 45 мг, повидон - 9 мг.

Форма выпуска

Таблетки покрытые оболочкой

Показания

В комплексной терапии при лечении: * хронических инфекций мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита), * неинфекционных хронических воспалений почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит). В качестве средства, препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней).

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, не разжевывая, запивая водой. Взрослым, по 2 таблетки 3 раза/день, детям школьного возраста &mdash, по 1 таблетке 3 раза/день. После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2-4 недель.

Противопоказания

* Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, * недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, * дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, * детский возраст до 6 лет, * повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача после оценки соотношения риска и пользы, в строгом соответствии с рекомендациями по применению.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции (при появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата), диспепсические расстройства (тошнота, рвота, диарея).

Передозировка

В настоящий момент данные о передозировке и интоксикации отсутствуют., Лечение: в случае передозировки препарата назначают симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна. Взаимодействие с другими лекарственными средствами на данный момент неизвестно.

Особые указания

* При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого количества жидкости противопоказано, * При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии. В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией, * В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу, * Усваиваемые углеводы, содержащиеся в одном драже, составляют менее 0.04 хлебных единиц (ХЕ). #### Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т.ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Условия хранения

В сухом месте