Инструкция по применению
Канефрон Н Раствор для приема внутрь 100 мл

Характеристики



Форма выпуска: Раствор
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Измельченное сырье золотысячника травы+корня любистока лекарственного+листьев розмарина
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 36.0

Описание

.

Действующее вещество

Измельченное сырье золотысячника травы+корня любистока лекарственного+листьев розмарина

Состав

В 100 г раствора содержиться: водно-спиртовой экстракт 29 г. Из лекарственного растительного сырья: травы золототысячника 0.6 г; корней любистока лекарственного 0.6 г; листьев розмарина 0.6 г.; Вспомогательные вещества: вода очищенная - 71 г.

Форма выпуска

Раствор

Показания

В комплексной терапии при лечении: хронических инфекций мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита); неинфекционных хронических воспалений почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит). В качестве средства, препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней).;

Способ применения и дозы

Препарат принимают внутрь, разведя в небольшом количестве воды или запивая водой.; Взрослым - по 50 капель 3 раза/день; детям школьного возраста - по 25 капель 3 раза/день, детям дошкольного возраста (старше 1 года) - по 15 капель 3 раза /день. После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2–4 недель. При необходимости, например, чтобы смягчить горький вкус для детей, препарат можно принимать вместе с другими жидкостями. Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости.; Перед применением препарат следует взбалтывать.

Противопоказания

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; алкоголизм (в т.ч. после антиалкогольного лечения); детский возраст до 1 года; повышенная чувствительность к компонентам препарата.;

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача только в том случае, когда предполагаемая польза для матери превосходит потенциальный риск для плода и ребенка.

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции (при появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата), диспепсические расстройства (тошнота, рвота, диарея).

Передозировка

В настоящий момент данные о передозировке и интоксикации отсутствуют.; Лечение: в случае передозировки препарата назначают симптоматическое лечение.

Взаимодействие с другими препаратами

Комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна.; Взаимодействие с другими лекарственными средствами на данный момент неизвестно.

Особые указания

При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого количества жидкости противопоказано.; При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии. В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией.; В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу.; В процессе хранения возможно легкое помутнение раствора или выпадение незначительного осадка, что не влияет на эффективность препарата.; Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами;Содержание в препарате этилового спирта составляет от 16.0 до 19.5% (в объемном отношении). В период лечения препаратом следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами и занятии другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

В сухом месте