# Инструкция по применению
# Канефрон Н Таблетки 120 шт

## Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Германия
Производитель: Bionorica
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Измельченное сырье золотысячника травы+корня любистока лекарственного+листьев розмарина
Количество в упаковке: 120




## Действующее вещество

Измельченное сырье золотысячника травы+корня любистока лекарственного+листьев розмарина

## Состав

На 1 таблетку: Активные компоненты: измельченное лекарственное растительное сырье: Золототысячника трава 18 мг, Любистока лекарственного корень 18 мг, Розмарина обыкновенного листья 18 мг. Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал кукурузный, повидон К 25, кремния диоксид коллоидный безводный. Оболочка: кальция карбонат, касторовое масло, глюкоза, краситель железа оксид красный (Е 172), крахмал кукурузный, декстрин, воск горный гликолевый, повидон К 30, рибофлавин, шеллак, сахароза, тальк, титана диоксид

## Форма выпуска

Таблетки

## Показания

Препарат применяется в комплексной терапии при лечении хронических инфекций мочевого пузыря (цистита) и почек (пиелонефрита), при неинфекционных хронических воспалениях почек (гломерулонефрит, интерстициальный нефрит), в качестве средства, препятствующего образованию мочевых камней (также после удаления мочевых камней).

**Способ применения и дозы**

Внутрь, не разжевывая, запивая водой. Взрослым: по 2 таблетки 3 раза в день. Детям школьного возраста: по 1 таблетке 3 раза в день. После ослабления остроты заболевания следует продолжить лечение препаратом в течение 2-4 недель. Во время лечения препаратом рекомендуется потребление большого количества жидкости.

**Противопоказания**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст (до 6 лет). Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы.

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только по назначению врача, в строгом соответствии с рекомендациями по применению и после оценки лечащим врачом соотношения риска и пользы.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции. Возможны расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота, диарея). При появлении признаков аллергической реакции следует прекратить прием препарата.

**Передозировка**

На настоящий момент данные о передозировке и интоксикации отсутствуют. В случае передозировки препарата назначается симптоматическое лечение.

**Взаимодействие с другими препаратами**

Комбинация с антибактериальными средствами возможна и целесообразна. Взаимодействия с другими лекарственными средствами на данный момент неизвестны.

**Особые указания**

При отеках, вызванных нарушениями функции сердца или почек, потребление большого количества жидкости противопоказано. При нарушенной функции почек препарат не следует назначать в качестве монотерапии. В случае воспалительного заболевания почек необходимо обратиться к врачу за консультацией. В случае наличия крови в моче, болей при мочеиспускании или при острой задержке мочи необходимо срочно обратиться к врачу. Усваиваемые углеводы, содержащиеся в одной таблетке, составляют менее 0,04 "хлебных единиц" (ХЕ). **Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:** Препарат не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

**Условия хранения**

Хранить в сухом и защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте. ### Срок годности Хранить в оригинальной упаковке, при температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте!