Инструкция по применению
Капсикам Мазь 15 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Эстония
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диметилсульфоксид
Количество в упаковке: 1



Описание

Мазь белого или белого со слегка желтоватым оттенком цвета, со специфическим запахом камфоры и скипидара.

Действующее вещество

Диметилсульфоксид

Состав

В 1 г мази содержится: активные вещества: диметилсульфоксид - 50 мг, камфора рацемическая - 30 мг, скипидар живичный - 30 мг, бензилникотинат - 20 мг, нонивамид - 2 мг, вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А) - 97 мг, натрия цетилстеарилсульфат - 38 мг, полисорбат-80 - 20 мг, бронопол - 1 мг, вода очищенная - до 1 г.

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Мазь быстро всасывается в близлежащие ткани. Всасывание в системный кровоток незначительно.

Показания

Мышечные и суставные боли, а также в качестве разогревающей мази для спортсменов.

Способ применения и дозы

Наружно. При мышечных и суставных болях - 1-3 г мази наносят при помощи аппликатора на область болезненного участка и слегка втирают в кожу 2-3 раза в день. При применении в качестве разогревающего средства у спортсменов наносят на массируемую область при помощи аппликатора. Небольшое количество мази (примерно 2-3 г) втирают массируемыми движениями до покраснения кожи. После тренировки следует смыть мазь с кожи прохладной водой. Длительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания, однако не следует применять препарат более 10 дней без консультации врача. Если Вы забыли применить препарат Если Вы забыли применить препарат, используйте его как можно быстрее и продолжайте применение как обычно. Не применяйте двойную дозу, если предыдущее время применения препарата было пропущено. Если Вы чувствуете, что действие препарата слишком сильное или слабое, скажите об этом врачу или провизору

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвы и кожные заболевания, беременность и период кормления грудью, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

В связи с отсутствием данных о безопасности применения мази во время беременности и кормления грудью применение мази в этот период не рекомендуется.

Побочные действия

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек или крапивница. Необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу. Перечисленные симптомы исчезают через 8-12 часов после прекращения применения мази.

Передозировка

При нанесении на кожу слишком большого количества мази могут возникнуть покраснение кожи, легкий проходящий зуд или ощущение жжения. При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу. Упаковку препарата возьмите с собой к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Взаимодействия не отмечались.

Особые указания

Следует избегать попадания мази на открытые раны, слизистые оболочки и глаза. Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату. После каждой процедуры следует вымыть руки прохладной водой с мылом. Лекарственные средства нельзя выбрасывать в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Проконсультируйтесь с провизором о том, как уничтожаются лекарства, которые больше не используются. Эти меры помогают защитить окружающую среду.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с техническими устройствами.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.