Инструкция по применению
Капсикам Мазь 30 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Эстония
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диметилсульфоксид
Количество в упаковке: 1



Действующее вещество

Диметилсульфоксид

Состав

Действующее вещество: диметилсульфоксид -50 мг, камфора рацемическая - 30 мг, скипидар живичный - 30 мг, бензилникотинат - 20 мг, нонивамид - 2 мг;
Вспомогательные вещества: цетостеариловый спирт эмульгирующий (тип А), натрия цетилстеарилсульфат, полисорбат-80, бронопол, вода очищенная.Концентрация действующего вещества (иг): 132 мг

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Данные по фармакокинетике препарата Капсикам не предоставлены.

Показания

Мышечные и суставные боли, а также в качестве разогревающей мази для спортсменов.

Способ применения и дозы

Наружно.При применении мази КАПСИКАМ в качестве разогревающего средства у спортсменов на мышечную область наносят при помощи аппликатора небольшое количество мази (примерно 2-3 г) и втирают массирующими движениями в кожу до легкого покраснения кожи. После тренировки следует смыть мазь с кожи прохладной водой.При мышечных и суставных болях -1-3 г мази наносят при помощи аппликатора на область болезненного участка и слегка втирают в кожу 2-3 раза в день. Длительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания, однако не следует применять препарат более 10 дней без консультации врача.После каждой процедуры следует вымыть руки прохладной водой с мылом!

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания с нарушениями целостности кожных покровов, беременность и период кормления грудью, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации.

Побочные действия

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази КАПСИКАМ могут возникнуть зуд, отек или крапивница. Необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу. Перечисленные симптомы исчезают через 8-12 часов после прекращения применения мази.

Передозировка

Данные о передозировке препарата Капсикам не предоставлены.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Капсикам не предоставлены.

Особые указания

Следует избегать попадания мази на открытые раны и слизистые оболочки. Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату.