Инструкция по применению
Капсикам Мазь для наружного применения 50 г

Характеристики

Форма выпуска: Мазь
Страна: Эстония
Производитель: Grindex
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Диметилсульфоксид
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Действующее вещество

Диметилсульфоксид

Состав

1 г мази содержит яд гадюки обыкновенной 0.05 МЕД, салициловая кислота 10 мг, камфора 30 мг, скипидар живичный 30 мг

Форма выпуска

Мазь

Фармакокинетика

Мазь быстро всасывается в близлежащие ткани. Всасывание в системный кровоток незначительно.

Показания

мышечная и суставная боль; в качестве разогревающей мази для спортсменов.

Способ применения и дозы

Капсикам применяют наружно. При мышечных и суставных болях – 1 – 3 г мази наносят при помощи аппликатора на область болезненного участка и слегка втирают в кожу 2 – 3 раза в день. При применении в качестве разогревающего средства у спортсменов наносят на массируемую область при помощи аппликатора. Небольшое количество мази (примерно 2 – 3 г) втирают массируемыми движениями до покраснения кожи. После тренировки следует смыть мазь с кожи прохладной водой. Длительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания, однако не следует применять препарат более 10 дней без консультации врача. Если Вы забыли применить препарат, используйте его как можно быстрее и продолжайте применение как обычно. Не применяйте двойную дозу, если предыдущее время применения препарата было пропущено. Если Вы чувствуете, что действие препарата слишком сильное или слабое, скажите об этом врачу или провизору.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, язвы и кожные заболевания, беременность и период кормления грудью, детский возраст.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано при беременности. На время лечения следует прекратить грудное вскармливание.

Побочные действия

При повышенной чувствительности кожи к компонентам мази могут возникнуть зуд, отек или крапивница. Необходимо прекратить применение мази и обратиться к врачу. Перечисленные симптомы исчезают через 8 – 12 часов после прекращения применения мази.

Передозировка

При нанесении на кожу слишком большого количества мази могут возникнуть покраснение кожи, легкий проходящий зуд или ощущение жжения. При случайном проглатывании мази обратитесь к врачу. Упаковку препарата возьмите с собой к врачу.

Взаимодействие с другими препаратами

Не описано.

Особые указания

Следует избегать попадания мази на открытые раны, слизистые оболочки и глаза. Во избежание побочных явлений рекомендуется предварительно нанести небольшое количество мази на кожу для определения чувствительности к препарату. После каждой процедуры следует вымыть руки прохладной водой с мылом! Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами Препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами и работать с техническими устройствами. Лекарственные средства нельзя выбрасывать в канализацию или вместе с бытовыми отходами. Проконсультируйтесь с провизором о том, как уничтожаются лекарства, которые больше не используются. Эти меры помогают защитить окружающую среду.

Условия хранения

Не допускать замерзания