Инструкция по применению
Карбопект Капсулы 110 мг 20 шт

Характеристики



Форма выпуска: Капсулы
Страна: Россия
Производитель: Медисорб
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Активированный уголь
Количество в упаковке: 20
Дозировка действующего вещества: 110 мг

Описание

Твердые желатиновые бесцветные капсулы № 0. Содержимое капсул: гранулы чёрного цвета. У гранул допускается наличие блестящих вкраплений.

Действующее вещество

Активированный уголь

Состав

Действующее вещество: активированный уголь 110,0 мг Вспомогательные вещества: пектин 127,0 мг, целлюлоза микрокристаллическая (тип 102) 63,0 мг, капсулы твердые желатиновые №0 "Кони Снеп": желатин 96,0 мг.

Форма выпуска

Капсулы

Фармакокинетика

Не всасывается, не расщепляется. Выделяется полностью через ЖКТ в течение 24 часов.

Показания

Применяется в качестве детоксицирующего средства: при экзогенных и эндогенных интоксикациях различного происхождения, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся диспепсией, метеоризмом, при комплексном лечении пищевой токсикоинфекции, сальмонеллеза, дизентерии, при отравлении лекарственными препаратами (психотропными, снотворными, наркотическими средствами и другими), алкалоидами, солями тяжелых металлов и другими ядами (в составе комплексной терапии), при пищевой и лекарственной аллергии, при гипербилирубинемии (вирусный гепатит и другие желтухи), при гиперазотемии (почечная недостаточность), для уменьшения газообразования в кишечнике перед ультразвуковым и рентгенологическим исследованием, с целью профилактики хронических интоксикаций на вредном производстве.

Способ применения и дозы

Внутрь за 1 -2 часа до или после еды и приема других лекарственных средств, запивая водой. Не рекомендуется запивать другими жидкостями во избежание снижения эффективности активированного угля. Режим дозирования взрослым в среднем по 4-8 капсул 3-4 раза в сутки, максимальная разовая доза для взрослых до 32 капсул. Детям препарат назначают в среднем из расчёта 0,05 г/кг массы тела 3 раза в сутки в зависимости от массы тела. Максимальная разовая доза для детей - до 0,2 г/кг массы тела. Детям с 3 лет и другим пациентам с затруднением проглатывания капсулы необходимо раскрыть, высыпать содержимое капсулы в емкость и развести небольшим количеством воды (не следует использовать для разведения другие жидкости) и применять в виде суспензии. Курс лечения при острых заболеваниях составляет 3-5 дней. При аллергических и других хронических заболеваниях - до 14 дней. Возможно проведение повторных курсов - через 2 недели по рекомендации врача. При острых интоксикациях лечение начинают с промывания желудка с использованием взвеси активированного угля, затем дают внутрь 20-30 г препарата. При метеоризме назначают внутрь по 4-8 капсул 3-4 раза в день. Курс лечения 3-7 дней. Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению препарата.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, язвенные поражения желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) (в том числе язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, неспецифический язвенный колит) в стадии обострения, кровотечения из ЖКТ, атония кишечника, одновременное назначение антитоксических лекарственных средств, эффект которых развивается после всасывания (метионин и другие), детский возраст до 3 лет.

Применение при беременности и кормлении грудью

Возможно применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочные действия

Диспепсия, окрашивание каловых масс в темный цвет. При длительном применении (более 14 дней) возможно снижение всасывания витаминов, кальция и других питательных веществ из желудочно-кишечного тракта. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими препаратами

Препарат Карбопект, снижает эффективность лекарственных препаратов, применяемых внутрь одновременно с ним.

Особые указания

При лечении интоксикации необходимо создать избыток активированного угля в желудке (до его промывания) и в кишечнике (после промывания желудка). Уменьшение концентрации активированного угля в среде способствует десорбции связанного вещества в просвет кишечника и его всасыванию в кровь (для предупреждения резорбции освободившегося вещества рекомендуется повторное промывание желудка и назначение активированного угля внутрь). Наличие пищевых масс в желудочно-кишечном тракте требует введения в высоких дозах, так как содержимое желудочно-кишечного тракта сорбируется активированным углем и его активность снижается. Если отравление вызвано веществами, участвующими в энтерогепатической циркуляции (сердечные гликозиды, индометацин, морфин и другие опиаты), необходимо применять активированный уголь в течение нескольких дней. При использовании препарата более 10-14 дней необходимо профилактическое назначение витаминов и препаратов кальция. Рекомендуется хранить в сухом месте, отдельно от веществ, выделяющих в атмосферу газы или пары. Хранение на воздухе (особенно влажном) снижает сорбционную способность.Влияние на способность управлять трансп. ср. и мех.:Исследования не проводились.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.