Инструкция по применению
КардиАСК Таблетки покрытые оболочкой 100 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: КАНОНФАРМА ПРОДАКШН
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Ацетилсалициловая кислота
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 100 мг



Действующее вещество

Ацетилсалициловая кислота

Состав

Ацетилсалициловая кислота 100 мг. Вспомогательные вещества: крахмал кукурузный, лактоза, МКЦ, пласдон К-90, кальция стеарат, твин-80, колликут МАЕ 100Р, пласдон S-630, пропиленгликоль, тальк, масло касторовое, титана диоксид.

Форма выпуска

Таблетки

Показания

Профилактика острого инфаркта миокарда при наличии факторов риска (например сахарный диабет, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, ожирение, курение, пожилой возраст) и повторного инфаркта миокарда. нестабильная стенокардия, профилактика инсульта (в т.ч. у пациентов с преходящим нарушением мозгового кровообращения). профилактика тромбоэмболии после операций и инвазивных вмешательств на сосудах (аорто-коронарное шунтирование, эндартерэктомия сонных артерий, артерио-венозное шунтирование, ангиопластика сонных артерий), профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей (например при длительной иммобилизации в результате большого хирургического вмешательства).

Способ применения и дозы

Внутрь, перед едой, запивая большим количеством воды. Длительность терапии определяет врач. Профилактика при подозрении на острый инфаркт миокарда - по 100–200 мг/сут или 300 мг через день (первую таблетку необходимо разжевать для более быстрого всасывания.) Профилактика впервые возникшего острого инфаркта миокарда при наличии факторов риска - по 100 мг/сут или 300 мг через день. Профилактика повторного инфаркта миокарда . нестабильная стенокардия, профилактика инсульта и преходящего нарушения мозгового кровообращения . профилактика тромбоэмболических осложнений после хирургических операций или инвазивных исследований - по 100–300 мг/сут. Профилактика тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии и ее ветвей - по 100–200 мг/сут или 300 мг через день.

Противопоказания

Гиперчувствительность к ацетилсалициловой кислоте, вспомогательным веществам и другим НПВС. эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, желудочно-кишечное кровотечение. бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и НПВС, триада Фернана-Видаля (сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости ацетилсалициловой кислоты). геморрагический диатез. печеночная/почечная недостаточность. беременность (I и III триместр) и период лактации.С осторожностью: при подагре, гиперурикемии, наличии в анамнезе: язвенных поражений ЖКТ, желудочно-кишечных кровотечений, почечной и печеночной недостаточности, бронхиальной астмы, хронических заболеваний органов дыхания, сенной лихорадки, полипоза носа, аллергических реакций на другие препараты. во II триместре беременности, в сочетании с метотрексатом в дозе менее 15 мг в неделю, при дефиците витамина К и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Не рекомендуется назначать пациентам моложе 18 лет из-за отсутствия клинических данных.

Применение при беременности и кормлении грудью

Применение салицилатов в высоких дозах в I триместре беременности ассоциируется с повышенной частотой дефектов развития плода (расщепление верхнего неба, пороки сердца). Назначение салицилатов в I триместре беременности противопоказано. Во II триместре беременности салицилаты можно назначать только после тщательной оценки риска для плода и пользы для матери, предпочтительно в дозах не выше 150 мг/сут и в течение непродолжительного времени. В III триместре беременности салицилаты в высокой дозе (более 300 мг/сут) вызывают ослабление родовой деятельности, преждевременное закрытие артериального протока у плода, повышенную кровоточивость у матери и плода, а назначение непосредственно перед родами может вызвать внутричерепные кровоизлияния, особенно у недоношенных детей. Назначение салицилатов в III триместре беременности противопоказано. Салицилаты и их метаболиты в небольших количествах выделяются с грудным молоком. Случайный прием салицилатов в период лактации не сопровождается развитием побочных реакций у ребенка и не требует прекращения грудного вскармливания. Однако при длительном применении препарата или назначении его в высокой дозе кормление грудью следует немедленно прекратить.

Побочные действия

Аллергические реакции крапивница, отек Квинке.Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, изжога, рвота, болевые ощущения в области живота, язвы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе перфоративные, желудочно-кишечные кровотечения, повышение активности «печеночных» ферментов. Со стороны дыхательной системы бронхоспазм.Со стороны иммунной системы анафилактические реакции.Со стороны системы кроветворения анемия (редко), повышенная кровоточивость.Со стороны центральной нервной системы головокружение, шум в ушах.

Особые указания

Аллергические реакции крапивница, отек Квинке.Со стороны пищеварительного тракта: тошнота, изжога, рвота, болевые ощущения в области живота, язвы слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, в том числе перфоративные, желудочно-кишечные кровотечения, повышение активности «печеночных» ферментов. Со стороны дыхательной системы бронхоспазм.Со стороны иммунной системы анафилактические реакции.Со стороны системы кроветворения анемия (редко), повышенная кровоточивость.Со стороны центральной нервной системы головокружение, шум в ушах.