Инструкция по применению
Кардибрилин Таблетки 60 мг 60 шт

Характеристики

Форма выпуска: Таблетки
Страна: Россия
Производитель: Озон
Порядок отпуска: по рецепту
Действующее вещество: Тикагрелор
Количество в упаковке: 60
Дозировка действующего вещества: 60 мг



Описание

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой от светло-желтого до светло-желтого с коричневатым оттенком цвета, круглые, двояковыпуклые.

Действующее вещество

Тикагрелор

Состав

1 таблетка содержит - тикагрелор 60 мг Вспомогательные вещества: маннитол, кальция фосфата дигидрат, гипромеллоза, карбоксиметилкрахмал натрия (тип А), магния стеарат.Состав оболочки: гипромеллоза, титана диоксид (Е171), тальк, макрогол-4000, краситель железа оксид желтый (Е172).

Форма выпуска

Таблетки

Показания

В комбинации с ацетилсалициловой кислотой: для профилактики атеротромботических осложнений у пациентов с острым коронарным синдромом (нестабильной стенокардией, инфарктом миокарда без подъема сегмента ST или инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST), включая пациентов, получавших лекарственную терапию, и пациентов, подвергнутых чрескожному коронарному вмешательству или аортокоронарному шунтированию; для профилактики атеротромботических осложнений у взрослых пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе (инфаркт миокарда перенесен 1 год и более назад) и высоким риском атеротромботических осложнений; для профилактики атеротромботических осложнений у пациентов в возрасте 50 лет и старше с ИБС и сахарным диабетом 2 типа, без инфаркта миокарда и/или инсульта в анамнезе, перенесших чрескожное коронарное вмешательство.

Противопоказания

Активное патологическое кровотечение; внутричерепное кровоизлияние в анамнезе; тяжелая печеночная недостаточность; совместное применение тикагрелора с мощными ингибиторами CYP3A4 (например, кетоконазолом, кларитромицином, нефазодоном, ритонавиром и атазанавиром); возраст до 18 лет; беременность, период грудного вскармливания; повышенная чувствительность к тикагрелору.

Применение при беременности и кормлении грудью

Противопоказано применение тикагрелола при беременности и в период лактации.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °C. Хранить в недоступном для детей месте.