**Инструкция по применению**
**Карипаин флакон 1 г 10 шт**

### Характеристики

Форма выпуска: Порошок
Страна: Россия
Производитель: АС-КОМ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 10
Срок годности: 24.0




### Описание

Сухой бальзам Карипаин - протеолитический ферментный препарат прямого действия растительного происхождения, полученный из латекса папайи. Применяется при лечении остеохондроза позвоночника, в том числе при различных формах грыж межпозвонковых дисков, грыжах Шморля, для лечения суставных контрактур (посттравматических и постинсультных), келоидных рубцов различного происхождения, дискогенного радикулита, туннельного синдрома.

### Форма выпуска

Порошок

### Показания

Карипаин - высокоэффективный препарат, применяемый при остеохондрозе позвоночника, в том числе при различных формах грыж межпозвонковых дисков, грыжах Шморля, для лечения суставных контрактур (посттравматических и постинсультных), келоидных рубцов различного происхождения, дискогенного радикулита, туннельного синдрома.

**Способ применения и дозы**

Может использоваться в любом медицинском учреждении, где есть аппарат для электрофореза (например, "Поток-1”). Методика специально адаптирована для удобного применения в поликлинике, МСЧ, медицинском центре, больнице.Лечение курсовое - 1 курс по 20 - 30 процедур. Допускаются перерывы в 1-2 дня между процедурами. При необходимости - повторные курсы через 30 - 60 дней.Для лечения остеохондроза позвоночника, шейного остеохондроза, протрузий межпозвонкового диска - рекомендован один курс лечения препаратом Карипаин - 20 - 30 процедур. Лечение межпозвонковых грыж - от 1 до 3 курсов по 20-30 процедур каждый (количество курсов определяется лечащим врачом). Между курсами интервал от 1 до 2 месяцев. При грыжах величиной более 5 мм рекомендуется 3 курса.Сухой бальзам Карипаин вводится методом электрофореза с положительного полюса. Непосредственно перед процедурой 1 флакон препарата разводится 10 мл физиологического раствора (или водой для инъекций). В раствор добавляют 2-3 капли Димексида. Температура прокладок - строго 37-39°С (контролируется водяным градусником), pH 5-7. Раствор наносится на фильтровальную бумагу белого цвета, размещенную на прокладках электрода. Размеры электрода прокладки 10х15 см. Сила тока до 10-15 мА (в начале каждой процедуры увеличивается постепенно, начиная с 5 мА). Время экспозиции от 10 до 20 минут также увеличивается постепенно. Несоблюдение данных параметров приводит к резкому снижению эффективности препарата!

**Применение при беременности и кормлении грудью**

Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам Карипаина, острые воспалительные процессы в тканях, секвестрация грыжи диска и фораменальное расположение секвестра.

**Передозировка**

При применении Карипаина возможны аллергические реакции. При повышенной чувствительности, проявляющейся зудом и повышением температуры, проводится антигистаминная терапия (тавегил, супрастин, кларитин, диазолин, местная обработка гидрокортизоном и т.д.).

**Взаимодействие с другими препаратами**

Между 5-й и 8-й процедурами возможно временное обострение основного заболевания, которое исчезает через 3-5 процедур. Важно не прекращать лечение! Карипаин нельзя вводить внутривенно или внутримышечно!

**Условия хранения**

В сухом темном месте