Инструкция по применению
Карипаин Ультра Гель для тела 30 мл

Характеристики

Форма выпуска: Гель
Страна: Россия
Производитель: АС-КОМ
Порядок отпуска: без рецепта
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 24



Описание

Карипаин ультра гель для тела имеет сбалансированный состав активных веществ. Карипаин ультра гель успешно применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Гель «Карипаин Ультра» с Папаином и Транскутолом был разработан и выпущен с целью увеличить эффективность профилактики и лечения позвоночника и суставов без применения физиотерапевтических процедур. Карипаин ультра гель благодаря включению в его состав фермента папаина, экстракта босвеллии и хондроитина показан к применению в комплексной терапии при таких заболеваниях, как: протрузия позвонков (предгрыжевые состояния); межпозвонковые грыжи; воспалительные и деформирующие заболевания суставов (артрозы, артриты, бурситы и т.п.); остеохондроз; остеоартроз; контрактуры суставов. Гель быстро впитывается, не оставляя жирного блеска.

Состав

Aqua, Sorbitol, Papain, Sodium Chondroitin Sulfate, Ethoxydiglycol, Boswellia Serrata Extract, Xantan Gum, PEG-8, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil (and) Propylene Glycol, Ascorbic Acid, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol (and) Ethylhexylglycerin, Parfum

Форма выпуска

Гель

Показания

Препарат Карипаин гель показан к применению в комплексной терапии при таких заболеваниях, как: протрузия позвонков (предгрыжевые состояния); межпозвонковые грыжи; воспалительные и деформирующие заболевания суставов (артрозы, артриты, бурситы и т.п.); остеохондроз; остеоартроз; контрактуры суставов.

Способ применения и дозы

Гель наносится на больной участок тела, будь это какой-либо отдел позвоночника, либо сустав. Тонким слоем и мягкими массирующими движениями втирается в кожу до полного впитывания. Применять: 3 раза в день по 2-3 грамма на 10 квадратных сантиметров Курс лечения: 4 недели Повторный курс: через 1 месяц

Противопоказания

Индивидуальная непереносимость компонентов продукта. При появлении каких-либо раздражений или аллергических реакций немедленно прекратить использование.

Применение при беременности и кормлении грудью

Гель не следует использовать в случае индивидуальной непереносимости активных или вспомогательных веществ препарата. Карипаин также не следует применять при секвестрации грыж диска, а также при остром воспалительном процессе в области мягких тканей.

Особые указания

При попадании в глаза, промыть их большим количеством воды.

Условия хранения

В сухом темном месте