Инструкция по применению
Кармолис капли для приема внутрь, ингаляций и наружного применения 20 мл

Характеристики

Форма выпуска: Капли
Страна: Австрия
Производитель: Д-р А. и Л. Шмидгалл
Порядок отпуска: без рецепта
Действующее вещество: Масла эфирные
Количество в упаковке: 1
Срок годности: 60



Описание

Кармолис Капли – натуральный лекарственный препарат на основе эфирных масел десяти лекарственных растений (аниса, коричника китайского, гвоздики, лимона, лаванды, мелиссы, тимьяна, шалфея, мяты перечной, мускатного ореха). Эфирные масла производятся методом двойной аквадистилляции – это позволяет извлечь лёгкие фракции масел без посторонних примесей, что значительно снижает риск развития аллергических реакций. Рецепт препарата Кармолис Капли известен более 400 лет. С 1611 года по Европе распространилась слава о « кармелитской воде» – рецепт составили монахи ордена кармелитов и столетиями держали его в тайне. В XIX веке кармелиты передали рецепт официальной медицине, и «кармелитская вода» появилась в Государственных Фармакопеях Европы, а в 1880 году – России. С 1953 года рецепт принадлежит австрийской компании «Д-р А. и Л. Шмидгалл» – фармацевтическому холдингу, выпускающему натуральные препараты под брендом «Кармолис». Для профилактики ОРВИ и гриппа, в комплексной терапии заболеваний Кармолис Капли принимают внутрь с тёплым питьём, а также делают ингаляции с добавлением препарата.

Действующее вещество

Масла эфирные

Состав

1 мл ментол 15.38 мг, масло тимьяна 15 мкг, масло анисовое 139 мкг, масло лимонника китайского 1.584 мг, масло гвоздичное 1.584 мг, масло лимона 1.1 мг, масло лаванды 1.584 мг, масло лаванды пряной 1.584 мг, масло мяты индийской (цитронеллы) 154 мкг, масло шалфея 316 мкг, масло мускатное 630 мкг. Вспомогательные вещества: этанол 94%, вода очищенная.

Форма выпуска

Капли

Фармакокинетика

Действие препарата является совокупным действием его компонентов, поэтому проведение кинетических наблюдений не представляется возможным; все вместе компоненты не могут быть прослежены с помощью маркеров или биоисследований. По этой же причине невозможно обнаружить и метаболиты препарата.

Способ применения и дозы

Для лечения и профилактики воспалительных заболеваниях верхних отделов дыхательных путей взрослым назначают внутрь по 10-20 капель, разведенных в стакане воды или по 3-5 капель на кусочек сахара до 5 раз/сут. Для ингаляций 20-25 капель добавляют к 1 литру горячей воды, перемешивают и дышат паром под полотенцем. При кашле препарат наносят на кожу груди и межлопаточную область и хорошо растирают, после чего указанные области закрывают теплой тканью. При артралгии, миалгии, люмбаго, ишиасе препарат наносят на пораженную область. Для усиления лечебного эффекта болезненный участок следует держать в тепле (прикрыть теплой тканью или повязкой). При явлениях диспепсии и в качестве седативного средства препарат назначают внутрь 3-4 раза/сут по 10-20 капель на кусочке сахара или разбавляют в стакане воды. При укусах насекомых, кожном зуде смазывают (не втирая) препаратом поврежденные участки кожи несколько раз в сут.

Противопоказания

— холецистит — обтурация желчных протоков — заболевания печени — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки — алкоголизм — эпилепсия — травматические повреждения головного мозга — беременность — лактация (грудное вскармливание) — детский возраст — повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и кормлении грудью

Препарат противопоказан к применению при беременности и в период лактации (грудного вскармливания).

Побочные действия

Возможно: аллергические реакции.

Передозировка

В настоящее время о случаях передозировки препарата Кармолис не сообщалось.

Взаимодействие с другими препаратами

Данные о лекарственном взаимодействии препарата Кармолис не предоставлены.

Особые указания

После использования препарата для растирания следует тщательно вымыть руки. Следует учитывать, что препарат содержит 64% этанола. Средняя рекомендуемая доза содержит 540 мг этанола. Содержание этанола следует также учитывать при одновременном назначении других препаратов. При местном применении следует избегать попадания препарата в глаза.

Условия хранения

В сухом месте